



Patiënteninformatie

Herceptin

Inhoud

Inleiding	4
Omschrijving en doel van de behandeling.....	4
Wat is Herceptin®?.....	4
Hoe wordt Herceptin® toegediend?	4
Waar wordt de therapie toegediend?	4
Verwikkelingen.....	5
Allergische reactie	5
Griepachtige verschijnselen.....	5
Diarree	5
Vermoeidheid	5
Speciale voorzorgen	6
Onderzoek hartfunctie	6
Opvang allergische reactie	6
Zwangerschap.....	6
Medicatiebeleid.....	6
Wanneer uw arts raadplegen?	6
Tot slot.....	7
Wie contacteren bij vragen / problemen?	7
Persoonlijke notities / vragen	7

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over Herceptin. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling

Wat is Herceptin®?

De werkzame stof van Heceptin® is Trastuzumab. Trastuzumab is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de zieke groei van deze cellen gestopt worden.

Hoe wordt Herceptin® toegediend?

Het geneesmiddel Herceptin® wordt toegediend in de vorm van een infuus.

De eerste toediening gebeurt trager dan de volgende toedieningen. De tijd van de eerste toediening bedraagt 90 minuten. Nadien blijft u nog gedurende 3 uren op de afdeling voor verdere observatie.

De volgende toedieningen van Herceptin® duren 30 minuten. Als de toedieningen zonder klachten zijn verlopen, mag u na de 3^{de} toediening direct naar huis.

Waar wordt de therapie toegediend?

U zult de chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De behandeling kan in het daghospitaal gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Verwikkelingen

Allergische reactie

Als u wordt behandeld met Herceptin® kunnen reacties, zoals koorts, ademhalingsmoeilijkheden, rillingen, huiduitslag en bloeddrukverlaging optreden. Deze verschijnselen treden voornamelijk op bij de eerste toediening.

Griepachtige verschijnselen

Griepachtige verschijnselen kunnen de eerste dagen na de behandeling opkomen met tekenen van hoofdpijn, lichte koorts, spierpijn en pijnlijke gewrichten. Deze klachten verdwijnen spontaan of eventueel met koortswerende medicatie (bv. paracetamol), maar bespreek dit wel met uw arts.

Diarree

Tijdens de eerste week na de toediening kan diarree met mogelijks buikpijn/buikkrampen optreden. Contacteer uw arts indien de diarree meer dan 4 keer per dag voorkomt en/ of langer dan twee opeenvolgende dagen duurt. Drink voldoende (vooral zoutrijke dranken, bv. bouillon) en neem geen eigen medicatie tegen diarree zonder medeweten van uw arts.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan tijdens uw behandeling optreden en in ernst toenemen. Na de behandeling zullen de klachten pas langzaam verminderen. Uw arts en verpleegkundige kunnen u advies geven hoe je best kan omgaan met deze vermoeidheid.

Speciale voorzorgen

Onderzoek hartfunctie

Herceptin kan de hartspierfunctie en longfunctie aantasten. Meld zeker vóóraf aan uw arts indien u een hartpatiënt bent, een hoge bloeddruk of een longziekte heeft. Uw hartfunctie zal vóóraf en tijdens de behandeling regelmatig onderzocht worden met een MUGA - scan onderzoek.

Opvang allergische reactie

Tijdens deze eerste toediening worden uw bloeddruk, hartritme en temperatuur gevolgd. In het geval bij u een reactie ontstaat, zal uw arts de infusie vertragen of onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kan de infusie worden voortgezet. Bij de volgende toedieningen zijn de risico's op de mogelijke reacties kleiner.

Zwangerschap

Vrouwen in de vruchtbare periode mogen niet zwanger geraken tijdens en tot 1 jaar na de behandeling met Herceptin®.

Medicatiebeleid

Meld uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt (inclusief die middelen die niet door uw dokter zijn voorgeschreven). Dit is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van meer dan één geneesmiddel de werking van geneesmiddelen versterkt of verzwakt kan worden. Daarom mag Herceptin® niet samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden zonder de toestemming van uw dokter.

Wanneer uw arts raadplegen?

Contacteer onmiddellijk uw arts bij:

- Onregelmatige hartslag.
- Plotse pijn op de borst
- Ademhalingsmoeilijkheden vooral 's nachts, hoesten.
- Zwelling van de enkels / benen.
- Een gevoel van benauwdheid of snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelende arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van Herceptin.

Wie contacteren bij vragen / problemen?

AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
Gelijkvloers

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 60 00

Persoonlijke notities / vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11