



Patiënteninformatie

Extra vaccinaties buiten het basisvaccinatieschema bij kinderen



Inhoud

Inhoud	2
Meningokokkenvaccinatie	3
• Type B	4
Bexsero®	4
Trumenba®	5
• Type ACWY	6
Nimenrix®	6
Menveo®	6
Pneumokokkenvaccinatie	7
Prevenar 20®	7
Vaccinatieschema	8
Tot slot	9
Wie contacteren bij vragen of problemen?	9
Persoonlijke notities/ vragen	10

Meningokokkenvaccinatie

Meningokokken zijn bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken, zoals **hersenvliesontsteking** en **bloedvergiftiging**. De infectie start soms met vage symptomen, maar kan razendsnel evolueren naar een levensbedreigende ziekte.

Meningokokkeninfecties komen gelukkig maar zelden voor. Cijfers kan je vinden in de tabel onderaan deze pagina. Wanneer de infectie toch optreedt, is dit vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar (in het bijzonder jonger dan 1 jaar) en adolescenten.

Type A,C,W,Y meningokokken vaccin (Nimenrix®) behoort tot het gratis vaccinatieprogramma en wordt standaard toegediend op 13 of 15 maanden leeftijd. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je kind te laten vaccineren tegen type B. Dit vaccin betaal je zelf.

	2020	2021	2022	2023	2024
aantal gevallen van alle types meningokokken	55	24	43	84	77
sterfgevallen	2	2	4	3	9
< 5 jaar	21	11	7	19	18
15-19 j	5	7	6	7	5
> 65 j	8	3	14	22	29
serotypeverdeling (%)					
serotype B	49,1	62,5	65,1	44	39
serotype C	10,9	4,2	2,3	1,2	1,3
serotype W	29,1	29,2	7	22,6	29,9
serotype Y	10,9	4,2	25,6	28,6	26

Type B

Bexsero®

€ 86,52 per vaccin

Toedieningsschema:

leeftijd bij eerste dosis	primaire immunisatie	intervallen tussen doses van primaire immunisatie	booster
2 tem 5 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis tussen 12 en 15 maanden met een interval van minstens 6 maanden
6 tem 11 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis in het 2e levensjaar met een interval van minstens 2 maanden
12 tem 23 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis met een interval van 12 tem 23 maanden
Vanaf 2 jaar	2 doses	minstens 1 maand	(enkel bij hoog risico op blootstelling)

Op dit moment kan Kind en Gezin dit vaccin **niet** toedienen. Wens je dit vaccin voor je kind, dan moet je hiervoor een afspraak bij je arts maken.

Jouw arts kan Bexsero tegelijkertijd toedienen met andere vaccins van het gratis vaccinatieprogramma. Dit kan volgens 3 schema's (zie tabel basisvaccinatieschema op pagina 7).

Je kan ook overwegen om Bexsero apart te geven van andere vaccinaties. Wanneer Bexsero® gelijktijdig toegediend wordt met andere vaccins zijn er namelijk enkele nevenwerkingen mogelijk zoals:

-  een verhoogd risico op koorts
-  gevoeligheid op de injectieplaats
-  verandering in eetgewoonten
-  prikkelbaarheid

Preventief paracetamol geven aan je kind, vermindert de kans op koorts en de ernst ervan.

Trumenba®

€ 76,98

Toedieningsschema: vanaf de leeftijd van 10 jaar: 2 dosissen met een interval van 6 maanden.

De belangrijkste bijwerkingen van beide Type B vaccins zijn:

-  pijn
-  roodheid en zwelling op de injectieplaats
-  koorts
-  hoofdpijn
-  prikkelbaarheid
-  slaperigheid

Type ACWY

Dit vaccin behoort tot het basisvaccinatieschema. Je kan dit **gratis** laten toedienen aan je kind bij Kind en Gezin, op de **leeftijd van 13 of 15 maanden**.

Als je dit wenst bestaat de mogelijkheid om het vaccin al **voor de leeftijd van 12 maanden** toe te dienen. Op dat moment is het vaccin **niet gratis** en moeten er 2 of 3 vaccins toegediend worden. Momenteel kan Kind en Gezin dit vaccin niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 maanden. Als je een vroegere vaccinatie wenst, moet je een afspraak maken bij je arts.

Nimenrix®

€ 52,60 (vanaf 6 weken)

Toedieningsschema:

-  Leeftijd 6 weken - 6 maanden: 3 dosissen: tussen de 1e en 2e dosis een interval van 2 maanden, de 3e dosis op de leeftijd van 12 maanden.
-  Leeftijd 6 maanden - 12 maanden: 2 dosissen: 2 e dosis op de leeftijd van 12 maanden met een tussenperiode van minstens 2 maanden na het vorige vaccin.
-  Vanaf leeftijd 12 maanden: 1 dosis.

Menveo®

€ 52,60

Toedieningsschema: vanaf leeftijd 2 jaar: 1 dosis.

De belangrijkste bijwerkingen van beide Type ACWY vaccins zijn:

-  verminderde eetlust
-  prikkelbaarheid
-  hoofdpijn
-  koorts
-  zwelling roodheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats

Pneumokokkenvaccinatie

Pneumokokken zijn bacteriën verantwoordelijk voor veel verschillende soorten infecties in kinderen: **hersenvliesontsteking, longontsteking, sepsis, oorontsteking,...**

Het basisvaccinatieschema bevat **Prevenar13®** en krijgt je kind **gratis**. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om dit te vervangen door het **betalende Prevenar20®**.

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om het huidige vaccin Prevenar13® te vervangen door Prevenar20®. Prevenar13® geeft namelijk bescherming tegen 13 types pneumokokken terwijl Prevenar20® beschermt tegen 20 types.

-  Als we de gegevens van 2023 in België bekijken, zien we dat Prevenar20® in 59% van alle invasieve pneumokokkeninfecties bescherming kan bieden bij een groep kinderen jonger dan 2 jaar en ook in 59% bij kinderen jonger dan 16 jaar.
-  Prevenar13® daarentegen kan bescherming bieden bij 14% van de invasieve pneumokokkeninfecties bij kinderen jonger dan 2 jaar en in 19% bij kinderen onder de 16 jaar.

Prevenar 20®

€ 67,51

Toedieningsschema:

-  Leeftijd 6 weken - 6 maanden: 4 doses: op 2, 4, 6 en 12 maanden oud.
-  Leeftijd 7 maanden tot 12 maanden: 3 doses: tussen de eerste 2 een interval van ten minste 8 weken. De derde dosis vanaf 12 maanden met interval van ten minste 8 weken.
-  Leeftijd 12 maanden tot 24 maanden: 2 doses, tussen de eerste 2 met een interval van ten minste 8 weken.
-  Leeftijd 2 jaar tot 5 (18) jaar: een enkelvoudige dosis.

Als je kind een onvolledig schema met Prevenar13® kreeg, kan dat aangevuld worden met Prevenar20®. Overleg dan voor het juiste schema zeker met je arts.

De belangrijkste nevenwerkingen zijn gelijkaardig aan die van Prevenar13®:

-  prikkelbaarheid
-  suf voelen
-  pijn/zwelling/roodheid op de vaccinatieplaats
-  koorts
-  verminderde eetlust

Vaccinatieschema

Leeftijd	2 m	2,5 m	3 m	4 m	4,5 m	5m	6 m	12 m	13 m	15 m
Hexyon® (polio, tetanus, difterie, kinkhoest, hepatitis B en h. infl B)	x		x	x					(x)	x
Prevenar 13® (pneumokokken)	x		(x)	x				x		
OF: Prevenar 20® (pneumokokken)	x			x			x	x		
Rotarix® (rotavirus)	x		x							
MMR® (mazelen, bof, rode hond)								x		
Nimenrix® (meningokokken ACWY)									(x)	x
Bexsero® (meningokokken B):										
Schema 1		x			x				x	
Schema 2			x			x			x	
(x) = prematurenschema										

Tot slot

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kan je terecht bij je behandelend arts of de verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Raadpleging kinderziekten
campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
Route C35
014 44 44 16

Persoonlijke notities/ vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je die hier noteren. Zo heb je ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) •
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout