

Patiënteninformatie

Gebruik van Emla® en Rapydan® bij kinderen



Inleiding

Deze brochure geeft je informatie over het gebruik van Emla® en Rapydan® bij kinderen. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om extra vragen te stellen aan de arts of verpleegkundige.

Omschrijving en doel van de behandeling

In deze brochure krijg je informatie over het gebruik van Emla®/Rapydan® bij kinderen.

Deze verbanden zorgen voor een plaatselijke verdoving om zo procedures die pijnlijk kunnen zijn aangenamer te laten verlopen.

Emla® en Rapydan® worden rechtstreeks op de huid van het kind aangebracht. Ze zorgen voor een lokale verdoving van de bovenste huidlaag. Je mag dit enkel gebruiken op een gezonde en intacte huid.

Je kan het gebruiken voor verschillende procedures zoals een bloedname, vaccinatie, plaatsen van een infuus, lumbale punctie, blaaspunctie, verwijderen van wratten,...

-  Als de arts of verpleegkundige aangeeft dat het gebruik van Emla® of Rapydan® aangewezen is bij een volgende afspraak, dan geeft de arts meestal aan op welke huidzone je de crème of pleister best aanbrengt. De meest voorkomende zones die we gebruiken bij bloedname of infuusplaatsing zijn de handrug en elleboogplooi.
-  Je kan Emla®/Rapydan® met een voorschrift van een arts kopen bij je huisapotheker.
-  Je brengt de crème of pleister thuis aan voor de afspraak op het tijdstip dat de arts of verpleegkundige aangeeft. De arts of verpleegkundige zal de pleister verwijderen in het ziekenhuis.






Gebruik van Emla® crème of Emla® patch (lidocaïne 25mg/1g)

Emla® mag je gebruiken vanaf de geboorte. Voor de dosering bij kinderen onder de leeftijd van 1 jaar volg je het advies van de arts op.

Na de leeftijd van 1 jaar mag je indien nodig 1 hele tube of 2 pleisters Emla® gebruiken (of meer indien de arts het aangeeft).



WERKWIJZE Emla® Crème

-  Controleer of de aangegeven huidzone intact, droog en schoon is.
-  Draai de dop van de zalf om de tube te openen.
-  Breng de pleister of crème in een hoopje ter grootte van een grote erwt of rups aan op een zichtbaar en/of voelbaar bloedvat op de aangeduide huidzones.
-  Wrijf de crème niet in, verspreid hem zo weinig mogelijk.
-  Verwijder het middenstuk van de pleister, de rand blijft intact. Verwijder vervolgens de bescherm laag van de plakken kant van de pleister.
-  Breng de pleister zorgvuldig aan over het hoopje crème. Duw de randen van de pleister goed aan zodat er geen lucht meer aan de crème kan komen.
-  Verwijder nu de rand.
-  Noteer het uur van aanbrengen.
-  De crème werkt optimaal na 1 uur tot maximaal 4 uur. Bij kinderen jonger dan 1 jaar is het best om de crème na 1 uur te verwijderen.



WERKWIJZE Emla® Patch = 1g

- 👉 Je mag de patch niet doorknippen.
- 👉 Controleer of de aangegeven huidzone intact, droog en schoon is.
- 👉 Verwijder het papiertje aan de kleefzijde van de pleister.
- 👉 Druk de randen van de pleister goed aan zodat deze goed vasthangt aan de huid. Druk zeker niet in het midden van de pleister anders komt de crème op de kleebrand terecht.
- 👉 Noteer het uur van aanbrengen.
- 👉 De pleister werkt optimaal na 1 uur tot maximaal 4 uur. Bij kinderen jonger dan 1 jaar is het beter om de pleister na 1 uur te verwijderen.



Gebruik van Rapydan® pleister (lidocaïne 70 mg en tetracaïne 70 mg)

Een Rapydan® pleister mag je gebruiken vanaf de leeftijd van **3 jaar**.

Werkwijze

-  Controleer of de aangegeven huidzone intact, droog en schoon is.
-  Open het foliezakje op het moment dat je de pleister gebruikt.
-  Knip de pleister nooit door.
-  Verwijder het plastic plaatje van de pleister. Raak het witte rondje dat het geneesmiddel bevat niet aan.
-  Breng de pleister zo aan dat het witte rondje de afgesproken huidzone bedekt.
-  Druk de pleister stevig aan op de randen.
-  Druk voorzichtig op het midden van de pleister om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel (witte rondje) in contact komt met de huid.
-  Noteer het tijdstip van aanbrengen. Rapydan® moet minimaal 30 minuten aanwezig zijn op de huid.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Kinderafdeling of raadpleging kinderartsen
campus Sint-Jozef AZ Turnhout
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

