

# NIEUWSBRIEF

Klinisch labo



NUMMER 2 – MAART 2023

## IN DIT NUMMER

### Algemeen

***Herinnering: wijzigingen terugbetaling vanaf 01/03/2023***

***Registratie bijaanvragen via email***

*Geachte collega,*

*In deze nieuwsbrief kan u de wijzigingen in onze labogids van de vorige maand vinden.*

*De meeste recente informatie is steeds beschikbaar in onze labogids:*

*AZ Turnhout*

*<https://www.azturnhout.be/diensten/medische-disciplines/laboratorium-voor-klinische-biologie/voor-zorgverleners/labogids>*

*AZ Herentals*

*<http://labogids.azherentals.be/>*

*AZ Mol (alleen bereikbaar intern in AZ Mol – nieuwe website in ontwikkeling)*

*<https://wwwtemp.azmol.be/nl/zorgverlener/toepassingen/Paginas/Labogids.aspx>*

*Collegiale groeten,*

*Laboratoriumdirecteur en stafleden klinisch laboratorium AZT, AZH en AZM.*

# NIEUWSBRIEF

## Klinisch labo



### Wijzigingen terugbetaling vanaf 01/03/2023

- MPO en PR3 kunnen **rechtstreeks** worden aangevraagd bij patiënten met aanwezigheid van klinische tekenen die wijzen op de mogelijkheid van **ANCA-geassocieerde vasculitis** voor patiënten die niet gekend zijn met ANCA-geassocieerde vasculitis (max 2) of bij patiënten met **ANCA-geassocieerde vasculitis in follow-up** (max 1). In die gevallen zal ANCA niet meer worden terugbetaald. Op basis van de geldende richtlijnen zal vanaf de maand april ANCA niet meer uitgevoerd worden, maar zal onmiddellijk MPO en/of PR3 worden bepaald.

Ter herinnering:

- Bepaling van **ureum** wordt alleen nog **terugbetaald bij een eGFR van minder dan 30 mL/min**. Het bepalen van ureum samen met een creatininebepaling heeft meestal geen toegevoegde waarde. Het doseren van ureum is vooral zinvol bij de diagnose van prerenale nierinsufficiëntie of bij klinische verschijnselen van nierinsufficiëntie en bij ernstige nierinsufficiëntie om te bepalen of dialysering zinvol is.
- **Sedimentatie is in combinatie met CRP niet meer terugbetaald**. CRP is een meer gevoelige en specifieke parameter dan de bezinkingsnelheid om inflammatie op te sporen in het bloed. Ook in de eerste 24u van een inflammatoire toestand zal de CRP verhoogd zijn, terwijl de bezinkingsnelheid nog normaal zal zijn. Ook na de afname van de inflammatoire toestand zal de CRP sneller normaliseren dan de bezinkingsnelheid. Volgens aanbevelingen is het niet zinvol om deze steeds samen te doseren. Alleen voor de aandoeningen arteriitis temporalis en polymyalgia rheumatica is een combinatie van deze testen nog aangewezen en zal een bedrag van 1.40 € aan de patiënt worden aangerekend.

### Registratie bijaanvragen via email

Graag vragen wij uw aandacht voor het gebruik van volgend emailadres voor registratie van bijaanvragen: [klinischlabo@azturnhout.be](mailto:klinischlabo@azturnhout.be). Deze mailbox wordt zeer regelmatig opgevolgd. Ook tijdens de afwezigheid van het secretariaat worden deze mails door de medisch laboratoriumtechnoloog behandeld.