



Information aux patients

La kinésithérapie après une césarienne

Table des matières

Table des matières	3
Introduction	4
Entrer et sortir du lit.....	4
Des exercices de circulation	4
Exercices de respiration.....	5
Les muscles du plancher pelvien.....	5
Les muscles abdominaux	6
Exercices des muscles du plancher pelvien	6
Exercices des muscles du plancher pelvien combinés à des exercices abdominaux	7
Conseils.....	8
Nos conseils pour la reprise du sport	8
De retour à la maison.....	9
Quelques conseils.....	9
A qui s'adresser en cas de problèmes ou de questions?	10
Notes/questions personnelles.....	10

Introduction

Félicitations avec la naissance de votre fils ou de votre fille!

Les semaines après l'accouchement, votre corps demande du temps à retrouver son état d'avant la grossesse. La présente brochure tend à vous présenter quelques exercices et conseils qui peuvent vous aider à cet effet.

S'il vous reste des questions après avoir lu la présente brochure, n'hésitez pas à consulter votre médecin, infirmier ou kinésiste. Ils vous donneront volontiers de plus amples explications.

Entrer et sortir du lit

Le lendemain de la césarienne, l'on vous demandera de sortir du lit un certain nombre de fois. Ce faisant, il est important de ne pas trop contracter vos abdominaux.

Une bonne façon de passer de la position couchée à la position assise: placez la tête du lit en position horizontale. Fléchissez les deux jambes et tournez-vous par ex. sur le côté droit. Mettez votre main droite sous votre cuisse droite. Amenez vos deux jambes à côté du lit pendant que vous levez votre tronc en vous appuyant sur votre coude droit. La main gauche sert en même temps d'appui sur le lit. À l'hôpital, vous pouvez d'abord redresser le chevet avant de vous mettre sur le côté.

Des exercices de circulation

Comme, les premiers jours, vous serez encore assez passive, il est important de stimuler la circulation sanguine.

Il vous est conseillé de faire les exercices suivants plusieurs fois par jour.

- En position couchée sur le dos, lever et descendre les pieds et faire des ronds avec les pieds.
- En position couchée sur le dos, fléchir les genoux en alternance.
- Bouger les bras.

Si vous souffrez d'œdème (accumulation de liquide) à hauteur des pieds, placez le pied du lit en position élevée.

Essayez quand même de circuler régulièrement. Ce faisant, vous pouvez soutenir votre ventre à l'aide de vos mains.

Exercices de respiration

Veillez à ne pas avoir une respiration trop brève et superficielle. Toutes les heures, essayez d'inspirer trois fois de suite le plus profondément possible et soufflez ensuite tranquillement l'air inspiré.

Si vous devez tousser, ne réprimez pas votre toux mais osez tousser à fond. Donnez un peu de contrepoids à votre plaie à l'aide de vos mains ou d'un coussin, cela soulage la douleur engendrée par la toux. Lorsque vous éternuez, vous vous mouchez le nez ou vous riez, vous pouvez également donner une certaine résistance à la plaie.


Les muscles du plancher pelvien

Les muscles du plancher pelvien sont les muscles qui ferment le bas du bassin. Ils sont tendus comme un "hamac" entre le pubis et le coccyx.


Le périnée a 4 fonctions importantes:

- une fonction de fermeture afin de retenir l'urine et les selles
- une fonction de soutien (afin de soutenir la vessie, l'utérus, les intestins)
- une fonction sexuelle
- une fonction de détente (il est important de bien pouvoir se détendre pour uriner et aller à selle)

La majorité des femmes atteintes d'incontinence, ont des fuites urinaires en cas de tension abdominale accrue: en toussant, en éternuant, en soulevant quelque chose.



vue latérale



vue du bas


Une grossesse et un accouchement affaiblissent généralement le plancher pelvien. Pendant la grossesse, le plancher pelvien doit supporter le poids croissant de l'enfant. En outre, les modifications hormonales engendrent un relâchement des muscles.

Un plancher pelvien affaibli peut entraîner des fuites urinaires involontaires (incontinence) et une descente d'organes. Ces troubles peuvent apparaître immédiatement après l'accouchement, mais ils peuvent également n'émerger que bien des années plus tard.

Nous observons souvent ce phénomène à la ménopause, car à ce moment des changements hormonaux se produisent à nouveau et les muscles du plancher pelvien peuvent s'affaiblir encore.

Les muscles abdominaux

Ensemble, les muscles abdominaux, périnéaux et dorsaux constituent un corset extensible de notre tronc. Ils comprennent différentes couches: les muscles abdominaux transverses, droits et obliques. Les muscles abdominaux aident à la respiration et veillent à la stabilité et à la mobilité du tronc. Pendant la grossesse, le ventre s'étend énormément. Après l'accouchement, le ventre s'affaisse tout à coup complètement et les muscles perdent momentanément leur tension.



Exercices des muscles du plancher pelvien

Afin de renforcer à nouveau ce plancher pelvien affaibli et afin de prévenir certains troubles, nous vous conseillons de faire dès que possible des exercices pour le plancher pelvien.

Commencez par 3 contractions consécutives. Elaborez-les tranquillement par la suite.

Essayez de faire les exercices pendant vos activités quotidiennes, par exemple en regardant la télévision, en repassant, en vous promenant, dans la voiture, en cuisinant, si vous devez attendre quelque part, ...

Ainsi, vous pouvez faire de l'exercice sans être obligée de réserver trop de temps supplémentaire.

Chez vous, essayez de faire une 60-aîne de contractions par jour (6x/jour une série de 10). Après un certain temps, cela deviendra un automatisme.

Exercice 1 : FORCE - soulever et détendre

Soulevez le plancher pelvien et serrez l'ouverture de l'urètre comme si vous reteniez votre urine. Faites-le brièvement et puissamment, puis relâchez complètement.

Exercice 2 : MAINTENIR - soulever et détendre

Soulevez le plancher pelvien et serrez l'ouverture de l'urètre comme si vous reteniez votre urine. Faites-le lentement, et maintenez pendant 2 à 10 secondes. Puis relâchez complètement.

Exercice 3 : CONTRÔLE - l'ascenseur

Soulevez le plancher pelvien en 2 ou 3 étapes. Au fur et à mesure que 'l'ascenseur' monte, serrez davantage les muscles du plancher pelvien. Le relâchement se fait également en deux ou trois étapes identiques.

CONSEIL

Essayez également de resserrer le plancher pelvien lorsque vous toussez, éternuez, soulevez des objets, etc. et relâchez ensuite.

Exercices des muscles du plancher pelvien combinés à des exercices abdominaux

Immédiatement après l'accouchement, le plancher pelvien comporte les muscles les plus importants à renforcer, mais vous pouvez toujours le faire en combinaison avec quelques exercices abdominaux simples.

Les exercices suivants peuvent être effectués dans différentes positions de départ : couchée, assise, debout, etc.

Exercice 1

Tirez votre plancher pelvien vers le haut, puis votre nombril vers l'intérieur. Maintenez cette tension pendant 3 secondes. Si cela fonctionne bien, augmentez le nombre de secondes.

Exercice 2 : avec la respiration

Inspirez doucement. Tout en expirant, tirez votre plancher pelvien vers le haut, puis votre nombril vers l'intérieur. Maintenez cette tension pendant 3 secondes.

Si cela fonctionne bien, augmentez le nombre de secondes. Continuez à respirer sans relâcher la tension.

Exercice 3

Inspirez doucement. En expirant, rétractez votre plancher pelvien et votre nombril. Soulevez ensuite votre pied gauche du lit ou du sol sans relâcher la tension dans votre plancher pelvien et votre abdomen. Répétez avec votre pied droit.

Vous pouvez rendre cet exercice plus lourd en levant un peu le pied ou en ramenant le genou plus vers l'abdomen.

Conseils

- Essayez de faire ces exercices quotidiennement chez vous.
- Commencez par les exercices de base.
- Ne passez pas aux exercices combinés avant de sentir que votre plancher pelvien est suffisamment fort. Si votre plancher pelvien est déjà relâché à la fin de l'exercice, il est trop tôt pour passer aux exercices combinés.

Les exercices précédents sont des exercices avec lesquels vous pouvez travailler pendant les six premières semaines. Si vous avez malgré tout des problèmes avec votre plancher pelvien ou si vous voulez alourdir les exercices, vous pouvez toujours consulter votre physiothérapeute.

Nos conseils pour la reprise du sport

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Semaine 0 - 6 | Marche, cross trainer, home-trainer, cyclisme facile |
| • Semaine 6 - 8 | Natation, cyclisme |
| • Semaine 8 - 10 | Spinning |
| • A partir de la semaine 13 | Course à pied, volley-ball, football, basket-ball |

De retour à la maison

De retour chez vous, vous ne vous sentirez pas tout de suite comme avant. La fatigue et une douleur due à votre plaie y jouent un rôle important. Ecoutez bien votre corps et cédez à la fatigue en vous reposant suffisamment.

Quelques conseils

- Les 6 premières semaines, évitez les tâches ménagères lourdes (nettoyage des sols, lavage des carreaux, ...) et ne soulevez donc pas des poids trop lourds (maximum 5-6 kg)
- Se promener, monter et descendre les escaliers, conduire la voiture, ... est autorisé! Mais il est important d'y aller doucement et progressivement, en fonction de ses propres capacités.
- Si la plaie est rouge, gonflée et douloureuse, cela peut signifier que vous avez trop travaillé. Si, cependant, ces symptômes persistent, il pourrait être question d'une infection. Dès lors, il vaut mieux le montrer au médecin traitant ou au gynécologue.

S'il vous reste des questions ou des remarques après avoir lu la présente brochure, vous pouvez vous adresser au service kinésithérapie.

A qui s'adresser en cas de problèmes ou de questions?

Revalidatiecentrum AZ Turnhout (Centre de revalidation)
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Secrétariat centre de revalidation



014 44 44 80

Notes/questions personnelles

Notez toute question ou remarque ci-dessous. Ce faisant, vous les aurez toujours sous la main lors d'un entretien avec votre médecin, infirmier ou kinésiste.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cette brochure informative a été rédigée par AZ Turnhout avec le plus grand soin. Son contenu est toutefois général et indicatif. Cette brochure ne couvre pas la totalité des aspects médicaux et ne peut remplacer vos consultations auprès d'un professionnel de la santé. AZ Turnhout, son personnel et ses médecins ne sont pas responsables des éventuelles erreurs, incomplétudes ou lacunes dans cette brochure.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

E.R.. : Jo Leysen • administrateur délégué AZ Turnhout vzw (représentant Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout