Patiënteninformatie

Secukinumab

Voorgeschreven door reumatoloog

az turnhout

Inhoud

Inhoud 2
Inleiding 3
Werking van secukinumab 3
Wanneer wordt secukinumab voorgeschreven? 3
Voorbereiding 4
Het gebruik van secukinumab 4
Hoe bewaar ik secukinumab? 4
Controle 5
Bijwerkingen van secukinumab 5
Zwangerschap en borstvoeding 6
Vaccinaties 6
Alcohol 6
Autorijden 6
Reisadvies 7
Zonlicht 8
Operaties 8
Gebruik van secukinumab samen met andere medicijnen 8
Behandelingsschema 9
Injectieschema 10
Tot slot 11

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u secukinumab gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt gelezen. Als u nog vragen hebt, kan u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van secukinumab

Secukinumab is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel dat het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Ons lichaam bevat verschillende eiwitten. Eén daarvan is interleukine (IL)-17. Secukinumab is een menselijk antilichaam tegen het eiwit interleukine (IL)-17. Interleukine (IL)-17 kan een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen en schade aan de gewrichten. Secukinumab vermindert de activiteit van interleukine (IL)-17 en remt het ontstekingsproces.

Secukinumab helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Wanneer wordt secukinumab voorgeschreven?

Secukinumab helpt bij de behandeling van volwassenen met een reumatische aandoening (zoals psoriasis artritis en axiale spondyloartropathie), als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

Voorbereiding

Voor de behandeling met secukinumab onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of deze veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt (gehad).

Het gebruik van secukinumab

U krijgt secukinumab via onderhuidse injecties met een prikpen. U leert hoe u dit zelf kunt doen.

- Voor patiënten met psoriasis artritis met matige tot ernstige plaque psoriasis is de aanbevolen dosis 150 mg via onderhuidse injectie. Tenzij er eerder een TNF-blokker werd gebruik waarbij onvoldoende effect plaats vond, dan zal een onderhoudsdosis van 300 mg worden voorgeschreven.

- Voor patiënten met axiale spondyloartropathie is de standaard aanbevolen dosis 150 mg via onderhuidse inspuiting.

- De eerste 5 injecties zijn zogenaamde oplaaddosissen en neemt u wekelijks.

- Vanaf dan gaat u verder met 1 injectie elke maand.

Het duurt enkele weken voordat er voldoende resultaat is bereikt.

Hoe bewaar ik secukinumab?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2°C - 8°C). Laat deze vóór toediening eerst 30 minuten op kamertemperatuur komen.

Controle

Tijdens de behandeling met secukinumab nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen van secukinumab

Sommige patiënten die secukinumab nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die secukinumab gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
    - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
    - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, …).

- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.

- **Allergische reacties**: U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.

- Milde klachten van de **huid** op de plaats van de inspuiting zoals roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Wij raden daarom aan om de plaats van inspuiting af te wisselen.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van secukinumab op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- U mag secukinumab niet gebruiken als u zwanger bent.
- U mag secukinumab niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die secukinumab gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

U mag (matig) alcohol gebruiken tijdens behandeling met secukinumab.

Autorijden

U mag autorijden tijdens gebruik van secukinumab.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van secukinumab naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

U moet de inspuitingen bewaren tussen 2°C en 8°C. De inspuitingen mogen niet getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig. Gebruik een koeltasje bij het vervoeren van secukinumab in uw handbagage.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat u secukinumab met bijbehorende injectiespuiten gebruikt op voorschrift van uw arts. U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van secukinumab. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende,kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Meestal kunt u doorgaan met het nemen van secukinumab.
- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u secukinumab gebruikt.
- Als u diabetes heeft of een tandheelkundige behandeling moet krijgen, overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van secukinumab samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts en apotheek over uw behandeling met secukinumab.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Behandelingsschema

Eerste periode van terugbetaling

5 wekelijkse toedieningen:

1ste injectie op startdatum:……

2e injectie na week 1:……

3e injectie na week 2:……

4e injectie na week 3:……

5e injectie na week 4:……

Maandelijkse toedieningen:

6e injectie na maand 2:……

7e injectie na maand 3:……

8e injectie na maand 4:……

Volgende periodes van terugbetaling:

Maandelijkse toedieningen

Injectieschema



Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- https://www.bcfi.be/nl/start
- http://bijsluiters.fagg-afmps.be/

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout