

Trastuzumab-emtansine



Uw behandeling bestaat uit trastuzumab gebonden aan chemotherapie emtansine. Trastuzumab emtansine is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de groei van de zieke cellen gestopt worden.



Het geneesmiddel wordt toegediend via infusie. U krijgt de infusie gedurende een periode van 90 minuten. Als de eerste infusie goed wordt verdragen, kan bij uw volgend bezoek de infusie gedurende een periode van 30 minuten worden toegediend.

Het geneesmiddel wordt om de 3 weken toegediend.

Mogelijke infuusreactie

Chemotherapie of antistoffen die via een infuus toegediend worden, kunnen een allergische reactie veroorzaken. Uw immuunsysteem reageert zo op de lichaamsvreemde eiwitten die het toegediend krijgt.

Hoe kan u een infuusreactie herkennen?

- Koude rillingen
- Koorts
- Spierpijn
- U bent kortademig, voelt zich benauwd
- Bloeddrukdalend (duizeligheid)
- Rode huiduitslag / rash
- Jeuk over het hele lichaam.

Deze klachten kunnen voorkomen tijdens de toediening, maar in vele gevallen komen ze pas nadien tot uiting. Daarom moet u na de behandeling soms nog even in observatie blijven. Deze klachten zijn tijdelijk.

Bij een allergische reactie zetten we het infuus stop, verwittigen we een arts en krijgt u anti-allergie medicatie toegediend.





Mogelijke interacties

- Alcohol: vermijd alcohol gedurende 1 dag voor en tot en met 2 dagen na de therapie.
- Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan uw arts.
- Pompelmoes, granaatappel, sterfruit



Mogelijke bijwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Aantasting beenmerg
- Grieperig gevoel de dag na de toediening
- Hartproblemen
- Wijziging stoelgangspatroon
- Vermoeidheid
- Reuk- en smaakverandering
- Vruchtbaarheidsproblemen
- Concentratie- en geheugen stoornissen



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- Urine: Zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden
- Sperma: gebruik van condoom bij betrekkingen
- Braaksel: Zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- Als u veel last heeft van bovenvermelde nevenwerkingen
- Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- Bij ongecontroleerde bloedingen (vb neusbloeding)
- Bij tintelingen, pijn, gevoelloosheid, jeuk, slapend gevoel in handen en voeten: Deze klachten kunnen wijzen op zenuwschade.