



Patiënteninformatie

# Beschikbare vaccins buiten het gratis vaccinatieprogramma



az turnho



# 1. Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over beschikbare vaccins buiten het gratis vaccinatieprogramma. U leest hierin meer over de vaccins en de toediening ervan. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts.

## 2. Windpokkenvaccin

Varicella (= windpokken, waterpokken, wijnpokken) wordt veroorzaakt door het varicella zoster virus. Hoewel de varicella-infectie meestal goedaardig verloopt, schat men dat er in België jaarlijks ongeveer 1000 hospitalisaties zijn in verband met windpokken, met 1 à 2 sterfgevallen per jaar. Hoewel zuigelingen en kinderen met een afweerstoornis het hoogste risico hebben op een ernstiger verloop van varicella, komen de meeste complicaties en hospitalisaties voor bij voorheen gezonde kinderen.

De exacte beschermingsduur na vaccinatie is nog niet gekend, maar op basis van de huidige wetenschappelijke evidentie mag men wellicht spreken van 10 tot 20 jaar na twee dosissen.

Er zijn 2 gelijkaardige vaccins beschikbaar.

### **Varilrix®**

 € 48,56

 Toedieningsschema:

- vanaf de leeftijd van 12 maanden
- 2 vaccins met een interval van minstens 6 weken

### **Provarivax®**





 € 52,52

 Toedieningsschema:

- 9-12 maanden leeftijd: 2 vaccins met interval van minstens 3 maanden
- vanaf 12 maanden: 2 vaccins met interval van minstens 1 maand

### **Mogelijke bijwerkingen**

De belangrijkste bijwerkingen na vaccinatie zijn:

-  roodheid of pijn op de inspuitplaats
-  huiduitslag
-  zwelling op de inspuitplaats
-  koorts

### 3. Meningokokkenvaccin

Meningokokken zijn bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Deze infectie die soms aanvangt met vage symptomen kan razendsnel evolueren naar een levensbedreigende ziekte. Bij kinderen jonger dan 5 jaar en adolescenten komt de ziekte het vaakst voor. Meningokokkeninfecties komen gelukkig maar zelden voor. In 2016 waren er 108 gevallen in België. De belangrijkste types meningokokken zijn Type B (63.9%), Type Y (15.7 %), Type W (9.3%) en Type C (8.3 %). Type C meningokokken vaccin behoort nu al tot het gratis vaccinatieprogramma.


Beschikbare vaccins:

#### Type B

Bexsero®

 € 86.52

 Toedieningsschema:

- Leeftijd 2-5 maanden: (4 dosissen) 3 dosissen met interval van minstens 1 maand. 4<sup>e</sup> dosis tussen 12 en 15 maanden met interval tussen 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> dosis van minstens 6 maanden.
  - Leeftijd 3-5 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval van minstens 2 maanden, 3<sup>e</sup> dosis tussen leeftijd 12-15 m met interval tussen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dosis van minstens 6 maanden.
  - Leeftijd 6-12 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval van minstens 2 maanden, 3<sup>e</sup> dosis in het tweede levensjaar met interval tussen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> dosis van minstens 2 maanden.
  - Leeftijd 12-24 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval van minstens 2 maanden, 3<sup>e</sup> dosis 12-23 maanden na 2<sup>e</sup> dosis.
  - Vanaf 2 jaar leeftijd: 2 dosissen met een interval van minstens 1 maand.
-  Kan tegelijkertijd toegediend worden met andere vaccins van het gratis vaccinatieprogramma.
-  Door een verhoogd risico op koorts, gevoeligheid op de injectieplaats, verandering in eetgewoonten en prikkelbaarheid, wanneer Bexsero® gelijktijdig toegediend wordt met de hierboven genoemde vaccins, kan overwogen worden om indien mogelijk de vaccinaties apart te geven. Preventief gebruik van paracetamol vermindert de kans op koorts en de ernst ervan.

De belangrijkste bijwerkingen zijn:

-  pijn
-  roodheid op de injectieplaats
-  koorts
-  hoofdpijn
-  prikkelbaarheid
-  slaperigheid

Er wordt aangeraden om preventief paracetamol te geven bij en na de vaccinatie.

## Type ACWY

Nimenrix®

 € 52,60 (vanaf 6 weken)

 Toedieningsschema:

- Leeftijd 6-12 weken: 3 dosissen: tussen de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> dosis een interval van 2 maanden, de 3<sup>e</sup> dosis op de leeftijd van 12 maanden.
- Vanaf leeftijd 12 maanden: 1 dosis.







Menveo®

 € 52,60

 Toedieningsschema

- Vanaf leeftijd 2 jaar: 1 dosis.

De belangrijkste bijwerkingen zijn:

-  verminderde eetlust
-  prikkelbaarheid
-  hoofdpijn
-  koorts
-  zwelling
-  roodheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats

## 4. Buitenlandse reizen

Voor buitenlandse reizen worden afhankelijk van de bestemming nog andere vaccinaties aangeraden. Hiervoor kan u de website van het Tropisch Instituut contacteren en het land van bestemming ingeven:

<https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde>

## 5. Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.

## 6. Wie contacteren bij vragen of problemen?

Raadpleging kinderziekten  
campus Sint-Jozef  
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout  
Route C35  
014 44 44 16



**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11

