

Jaypirca® (pirtobrutinib)



Jaypirca®, met pirtobrutinib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van **mantelcellymfoom** (type kanker van de lymfeklieren).



Jaypirca® remt in het lichaam het Bruton's tyrosinekinase. Dit is een eiwit dat de kankercellen helpt te groeien en overleven. Door dit eiwit te remmen, helpt Imbruvica® de **kankercellen te doden** en zo hun **aantal te verminderen**. Het **vertraagt** ook de **verergering** van de kanker.



Elke tablet Jaypirca® bevat 100 mg pirtobrutinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** bedraagt 200 mg. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag** op een vast tijdstip de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Jaypirca® 100 mg



Neem Jaypirca® **MET** of **ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten en capsules **niet breken of openen, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** Jaypirca® bent **vergeten**, dan kan je binnen de 12 uur na de gebruikelijke inname de vergeten dosis alsnog **zo snel mogelijk ingenomen worden**. Indien meer dan 12 uur na de gebruikelijke inname, **sla je deze dosis over**. Ga daarna op de volgende dag verder met je gebruikelijke schema. **Neem geen dubbele dosis** om de vergeten dosis in te halen.



Tijdens de behandeling met Jaypirca® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Jaypirca® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Jaypirca® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.



Als je je duizelig of vermoeid voelt door de behandeling met Jaypirca®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt of een machine gebruikt**.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Jaypirca® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal witten bloedcellen en bloedplaatjes
- ✓ Bloedingen, kneuzingen en blauwe plekken
- ✓ Vermoeidheid, bloedarmoede
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Misselijkheid
- ✓ Diarree
- ✓ Buikpijn
- ✓ Spier- en gewrichtspijn



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Jaypirca® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij bloedneus, blauwe plekken, bloed in de ontlasting of urine, zwaardere menstruaties, verwardheid
- ✓ Bij snelle hartslag, zwakke of onregelmatige hartslag (polsslag)



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 04/07/2025