

Tibsovo® (ivosidenib)



Tibsovo®, met ivosidenib als werkzame stof, wordt gebruikt bij de behandeling van **acute myeloïde leukemie**. Dit is een kanker van het beenmerg die leidt tot ongeremde groei van jonge witte bloedcellen. Tibsovo® kan ook gebruikt worden voor de behandeling van een bepaalde vorm van **galwegkanker**.



Tibsovo® remt in het lichaam het isocitraatdehydrogenase (IDH)-1. Dit is een eiwit dat de kankercellen helpt te groeien. Door dit eiwit te remmen, helpt Tibsovo® de groei van de kankercellen te **vertragen**.



Tibsovo® is beschikbaar in tabletten van 250 mg. De aanbevolen **dagelijkse dosis** bestaat uit **500 mg eenmaal daags**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **eenmaal per dag**, op een vast tijdstip de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Tibsovo® 250 mg



De tabletten Tibsovo® moeten met voedsel worden ingenomen. Slik de tabletten in hun geheel door met een half glas water. Je mag ze **niet breken, fijnmalen of erop kauwen**.



Als je een **dosis** Tibsovo® bent vergeten, dan kan je de **gemiste dosis** nog **innemen** als je dit opmerkt **binnen de 12u** na het gebruikelijke tijdstip. Indien er **meer dan 12u** verstreken zijn, sla je de toediening **over** en neem je de volgende dosis in op het volgende geplande tijdstip.

Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten dosis in te halen.



Tijdens de behandeling met Tibsovo® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Combinatie met Pradaxa® (dabigatran) is tegenaangewezen.

Als je tijdens je behandeling met Tibsovo® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Tibsovo® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook je bloeddruk opvolgen.



Als je je duizelig voelt door de behandeling met Tibsovo®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt of een machine gebruikt**.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Tibsovo® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Stijging van het aantal witte bloedcellen, koorts, vochtophoping, huiduitslag...
- ✓ Braken
- ✓ Daling van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes
- ✓ Duizeligheid
- ✓ Slapeloosheid
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Pijn in de ledematen
- ✓ Rugpijn
- ✓ Gewrichtspijnen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Tibsovo® hebt ingenomen
- ✓ Bij koorts ($> 38^{\circ}\text{C}$), met of zonder tekenen van infectie
- ✓ Bij palpitate, duizeligheid, syncope
- ✓ Bij last van pijn of ongemak op de borst, kortademigheid
- ✓ Bij snelle hartslag, zwakke of onregelmatige hartslag (polsslag)



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 04/07/2025