

Temozolomide®



Temozolomide® wordt gebruikt voor de behandeling van specifieke vormen van **hersentumoren**. Temozolomide® wordt onder andere gebruikt bij pas gediagnosticeerd **multiform glioblastoom**. Temozolomide® wordt eerst gebruikt in combinatie met radiotherapie (combinatiebehandelingsfase) en daarna afzonderlijk (monotherapiefase).



Temozolomide® wordt in het lichaam omgezet tot specifieke producten die in staat zijn de erfelijke informatie van de cel (DNA) te beschadigen. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 6 soorten Temozolomide® capsules: capsules met 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg en 250 mg temozolomide. De aanbevolen dagelijkse dosis hangt af van je **lichaamsoppervlakte** (berekend op basis van je lengte en gewicht). Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid **éénmaal per dag** in op een vast tijdstip buiten de maaltijd, met een glas water.

De behandeling met Temozolomide® verloopt in 2 fasen (zie innameschema):

- Gedurende de **combinatiebehandelingsfase** volg je een cyclus van 7 dagen. Op 5 van de 7 dagen krijg je radiotherapie. Neem Temozolomide® 1 uur voor de radiotherapie in.
- De behandeling wordt 4 weken onderbroken: GEEN Temozolomide® en GEEN radiotherapie
- Gedurende de **monotherapiefase** volg je een cyclus van 28 dagen. Neem Temozolomide® in op de eerste 5 dagen. Daarna neem je gedurende 23 dagen geen Temozolomide® in.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsule(s) Temozolomide® ... mg



Neem Temozolomide® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Temozolomide® ten minste **1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd** moet innemen. Je mag de capsules niet openen, fijnmaken of erop kauwen. Bij contact van de poederinhoud met de huid, ogen of neus onmiddellijk het gebied spoelen water en zeep.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem de capsule(s) dan meteen in zodra je eraan denkt. Ga de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Temozolomide® kan een wisselwerking geven met andere geneesmiddelen. Bespreek met je arts welke andere geneesmiddelen je neemt vooraleer je de behandeling met Temozolomide® start. Als je tijdens je behandeling nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Temozolomide® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.



Als je je moe of slaperig voelt door de behandeling met Temozolomide®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Temozolomide® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ✓ Verminderde eetlust (anorexia) | ✓ Misselijkheid en braken |
| ✓ Hoofdpijn | ✓ Vermoeidheid |
| ✓ Stuipen (convulsies) | ✓ Huiduitslag (rash) |
| ✓ Moeilijke stoelgang (obstipatie) | ✓ Haaruitval (alopecia) |

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Temozolomide® hebt ingenomen
- ✓ Bij allergische reactie: slik- of ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van lippen, tong, gezicht, een ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag, pijnlijke zwellingen van de huid (netelroos)
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Als je ernstige hoofdpijn hebt die niet overgaat
- ✓ Bij kortademigheid, hoesten



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.





Innameschema Temodal®



Cyclus 7 dagen van .../.../.... tot .../.../....							
	1	2	3	4	5	6	7
	Temodal® ... mg						
	Radiotherapie						

Cyclus 28 dagen van .../.../.... tot .../.../....																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Temodal® ... mg																											