



Patiënteninformatie

Behandeling van de nervus splanchnicus of de plexus coeliacus: proefblock – PRF – RF - alcoholisatie

Inhoud

Inleiding	3
Omschrijving en doel van de behandeling.....	3
Vorbereiding op de behandeling.....	4
Verloop van de behandeling.....	5
Proefblokkade	5
Verdere behandeling: PRF – RF – Alcoholisatie.....	5
Verloop na de behandeling	6
Verwickelingen.....	6
Tot slot.....	7
Wie contacteren bij vragen / problemen?	7
Persoonlijke notities/ vragen	7

Meer info op www.azturnhout.be/pijncentrum

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling van de nervus splanchnicus of de plexus coeliacus: proefblock – PRF – RF - alcoholisatie. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.


Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt en begeleiding te voorzien 3uur na de behandeling.

Omschrijving en doel van de behandeling

Samen met de doorverwijzende arts en/of de specialist van het pijncentrum heeft u besloten om over te gaan tot behandeling van de nervus splanchnicus of van de plexus coeliacus.

De splanchnische zenuwen vormen de verbinding tussen de zenuwknopjes (ganglia) van de plexus coeliacus en de sympathische grensketen. Deze zenuwen liggen tegen de zijrand van de onderste wervels van de borstkas, zowel aan de linker als aan de rechter zijde. Wanneer er klachten zijn van chronische bovenbuikpijn kan een behandeling van de splanchnische zenuwen of plexus coeliacus soms aangewezen zijn.

Initieel zal er meestal een proefblokkade gebeuren van de splanchnische zenuwen of van de plexus coeliacus uitgevoerd worden.



Gelieve ons tijdig te verwittigen

- Indien u zwanger bent (er mogen dan geen röntgenstralen gebruikt worden)
- Indien u bloedverdunners neemt
- Indien u allergisch bent aan contraststoffen , lokale verdoving, ontsmettingsmiddelen of pleisters
- Indien u uw afspraak niet kan nakomen

Wat moet u meebrengen?

- De verwijsbrief van de arts met ingevulde achterzijde
- Een lijst van alle medicatie die u neemt
- Protocol van MRI / CT-scan indien genomen in een ziekenhuis buiten Turnhout

Vorbereiding op de behandeling

Deze behandeling gebeurt tijdens een dagopname in het pijncentrum. U krijgt een zetelbed toegewezen en er zal gevraagd worden een operatieschortje aan te doen. Er zal een infuus worden aangebracht. Dit dient voor de veiligheid. Uw ondergoed mag u aanhouden. U dient niet nuchter te zijn.

Deze procedure gebeurt onder een lokale verdoving samen met een roesje. De behandeling wordt uitgevoerd in de behandelingszaal van het interventioneel pijncentrum. Er zal u gevraagd worden om op de buik te gaan liggen op de behandelingstafel. We letten er op dat u zo comfortabel mogelijk kan liggen. Met röntgenstralen wordt dat deel van de wervelkolom in beeld gebracht ter hoogte van de zenuwen die we willen infiltreren.

De huid zal ontsmet worden. Dit kan wat koud aanvoelen.

Het is heel belangrijk dat u tijdens de hele procedure stil blijft liggen. Wanneer u zich niet comfortabel voelt, u niet op een aangename manier op de behandelingstafel ligt of wanneer u zich zorgen maakt over iets, mag u dat steeds melden. Wij zullen er alles aan doen om het u zo aangenaam mogelijk te maken.

Verloop van de behandeling

Proefblokkade

Bij deze behandeling plaatst de pijnarts onder radioscopiecontrole één of twee naalden ter hoogte van de splanchnicuszenuwen of de plexus coeliacus. Via deze naalden wordt er dan een lokaal verdovende stof ingespoten zodat deze tijdelijk verdoofd worden.

Het is zeer belangrijk dat u gedurende het uur na de inspuiting nagaat of de buikpijn verminderd of verdwenen is aangezien het hier gaat om een proefblokkade.

Indien de pijnklachten kortdurig verminderd zijn betekent dit dat de pijnklachten (gedeeltelijk) verder geleid worden door de plexus coeliacus en de splanchnische zenuwen.

Verdere behandeling: PRF – RF – Alcoholisatie

Indien de proefblokkade tijdelijke verbetering geeft van de buikpijnklachten kan beslist worden deze zenuwen verder te behandelen door middel van PRF, RF of alcoholisatie.

Deze verdere behandelingen gebeuren op ongeveer dezelfde manier als het proefblok.

Een **PRF behandeling** betekent dat de zenuwen “gemoduleerd” worden om minder pijnprikkels te geleiden naar de hersenen.

Een **RF behandeling** betekent dat de zenuwen verwarmd worden tot 80 graden Celsius en er op deze manier een partieel letsel optreedt van deze zenuwen ook met het doel om minder pijnprikkels te laten geleiden van de buik naar de hersenen toe.

Een **alcoholisatie** betekent dat er pure alcohol (ethanol) wordt ingespoten in de ruimte waar deze zenuwen zich bevinden. Deze alcohol zal ervoor zorgen dat deze zenuwen volledig verbrand worden ook met het doel om minder of geen pijnprikkels te laten geleiden van de buik naar de hersenen toe.

Verloop na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de dagzaal. Daar kan u even bekomen, iets drinken of eten. Het is mogelijk dat u een warmtegevoel, tintelingen of krachtverlies in de arm ervaart.

Aangezien de eerste infiltratie (meestal) een diagnostische infiltratie is, **is het heel belangrijk dat u tijdens het eerste uur na deze procedure goed evalueert of de pijnklachten verminderd zijn**. Een tijdelijke maar belangrijke vermindering van uw klachten na deze infiltratie betekent dat deze infiltratie positief was en dat een verdere behandeling met een langduriger resultaat gepland kan worden. Hier gaat het dan om een gepulseerde radiofrequente (PRF) behandeling, een radiofrequente behandeling of een alcoholisatie.

De dag van de procedure mag u niet zelf een voertuig besturen. U mag wel met het openbaar vervoer komen.

Gelieve 6 tot 8 weken na de behandeling het “registratieformulier na pijnbehandeling” in te vullen en te bezorgen aan het onthaal van het ziekenhuis ofwel op te sturen naar AZ Turnhout, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout.

Verwikkelingen

Deze ingreep is nagenoeg zonder complicaties. Toch kunnen onverwachts neveneffecten optreden. Mogelijke zeldzame complicaties kunnen zijn:

- Infectie met eventueel abcesvorming
- Bloeding
- Lage bloeddruk
- Diarree
- Klaplong (pneumothorax): doordat de naalden dicht in de nabijheid van de longen geplaatst worden bestaat het risico dat de tip van de naald het longvlies raakt. Hierdoor kan een klaplong ontstaan waarvoor soms een thoraxdrain dient geplaatst te worden.
- Verlamming (uiterst zeldzaam)

Om die reden volgen we een streng beleid naar de inname van bloedverdunners, werken we onder strikt steriele condities (ontsmetting,

handschoenen) en worden de naalden heel nauwkeurig onder röntgendoorlichting of onder echogeleide geplaatst.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kan u terecht bij de behandelende arts of verpleegkundige.

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van deze behandeling.

Indien u vragen heeft over de behandeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de pijnkliniek op het nummer **014 44 42 71**.

Wie contacteren bij vragen / problemen?

Secretariaat pijncentrum
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 44 42 71

www.azturnhout.be/pijncentrum

Bij urgente problemen 's nachts of in het weekend, kan u zich richten tot de dienst spoedgevallen die dan eventueel doorverbindt met de dienst anesthesie.

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11