

Sacituzumab govitecan



Uw therapie **sacituzumab govitecan** werkt door zich aan kankercellen in uw lichaam te hechten. Het geneesmiddel komt dan in de kankercellen terecht en doodt deze waardoor het helpt om de kanker te bestrijden.



Verloop van de therapie

- ✓ Intraveneuze toediening
- ✓ Één cyclus is 3 weken met toediening op dag 1 en dag 8
- ✓ Eerste infuus over 3 uur, vanaf de 2^{de} cyclus kan dit over 1 à 2 uur indien geen infuusreactie
- ✓ Extra thuismedicatie: corticosteroiden op dag 2 en dag 3 bij het ontbijt



Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Nevenwerkingen

- ✓ Diarree
- ✓ Laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Misselijkheid
- ✓ Haarverlies



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.