

Scemblix® (asciminib)



Scemblix®, met asciminib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van **leukemie** onder de vorm van **Philadelphia-chromosoompositieve chronische myeloïde leukemie** in de chronische fase die eerder behandeld zijn met twee of meer antikankergeneesmiddelen (tyrosinekinaseremmers).



Scemblix® remt in kankercellen specifieke eiwitten, de zogenaamde **BCR-ABL1-tyrosinekinasen** die belangrijk zijn voor de groei en deling van cellen. Deze eiwitten zijn bij sommige kankercellen abnormaal actief waardoor de cellen ongecontroleerd gaan groeien. Scemblix® remt deze eiwitten. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Scemblix® tabletten: tabletten met 20 mg en 40 mg asciminib. **De aanbevolen dagelijkse dosis is 40 mg, tweemaal per dag.** Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag op een vast tijdstip**, de aanbevolen dosis in met een glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Scemblix® ... mg



Neem Scemblix® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat tot 2 uur voor en 1 uur na de inname van Scemblix® niet gegeten mag worden.

Slik de tablet(ten) **in hun geheel** door met een **glas water**. Je mag de tablet(ten) niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis bent vergeten** en het duurt nog 6 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tablet(ten) dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 6 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over en ga je de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen. Bij braken na inname de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Scemblix® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Scemblix® nog andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Scemblix® kan problemen geven met de **pancreas en de samenstelling van je bloed verstoren**. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen en je pancreaswaarden te controleren. Ook zal de arts controleren/navragen of u drager bent van het **Hepatitis B virus**, omdat Scemblix kan zorgen voor een heractivering van dit virus.



Als je je duizelig, zwak of moe voelt door de behandeling met Scemblix®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Scemblix® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Infectie van de bovenste luchtwegen, kortademigheid (dyspneu) en hoesten
- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Misselijkheid, braken, buikpijn
- ✓ Diarree
- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met een verhoogd risico op infecties tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met een verhoogd risico op bloedingen en blauwe plekken tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid en zwakte tot gevolg
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid
- ✓ Verhoogde bloeddruk
- ✓ Gewrichtspijn, spierpijn, botpijn, algemene lichamszwakte
- ✓ Huiduitslag (rash), jeuk
- ✓ Vochtophoping in de benen, enkels, voeten of in het gezicht (oedeem)
- ✓ Leverfunctiestoornissen
- ✓ Verhoogd lipase: hyperlipasemie
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Verstoring vetstofwisseling



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Scemblix® hebt ingenomen
- ✓ Bij ernstige pijn in de bovenbuik die te wijten kan zijn aan de pancreas
- ✓ Bij zwakte, spontane bloedingen of blauwe plekken of veelvuldige infecties met klachten zoals koorts, rillingen, keelpijn of mondzweren (kan duiden op beenmergsuppressie)
- ✓ Bij hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst of kortademigheid (kan duiden op hypertensie)



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 04/07/2025