

Oxaliplatine



Uw therapie bestaat uit het **celremmend geneesmiddel: Oxaliplatine**. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. **Oxaliplatine** wordt 2-wekelijks toegediend op het dagziekenhuis. De toedieningsduur is 2 uur.

Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties bloedarmoede (vb: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Licht haarverlies
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Tijdelijke smaak en geurverandering
- ✓ Invloed op de seksualiteit
- ✓ **Stoornis van de zenuwen**
 - Dit kan leiden tot **tinteling of verstijving** van: vingers, tenen, mond of keel (gevoel van niet goed kunnen ademen of slikken)
 - Klachten worden uitgelokt door **koude**
 - **Tips:**
 - Vermijd lang buiten blijven bij koude
 - Draag handschoenen en sjaal
 - Vermijd airco, koelkast
 - Handen wassen met warm water
 - Eet/ drink geen koude voeding





Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Algemene raadgeving

- ✓ Gebruik neutrale zeepproducten
- ✓ Vermijd zonlicht maximaal en bescherm uw huid met zonnebescherming



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie