

Votrient® (pazopanib)



Votrient®, met pazopanib als werkzame stof, wordt gebruikt bij verschillende types kanker, zoals **uitgezaaide niercelkanker** (mRCC) en bepaalde subtypes van **gevorderd weke-delensarcoom** (een vorm van kanker van de weefsels die de organen steunen, omgeven en beschermen).



Votrient® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïne-kinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en te **verspreiden**. Votrient® blokkeert ook de **vorming van bloedvaten rond de tumor** waardoor er **geen zuurstof en voedingsstoffen** naar de tumorcel kunnen gevoerd worden. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Votrient® tabletten: tabletten met 200 mg en 400 mg pazopanib. Meestal wordt gestart met een **dagelijkse dosis** van **800 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen of de ziekte erger wordt, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen dosis in **op een vast tijdstip, eenmaal per dag** met een glas water. Neem de tabletten één voor één in.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Votrient® ... mg



Neem Votrient® **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Votrient® moet innemen **ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten**.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Tijdens een behandeling met Votrient® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Votrient® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Votrient® kan de werking van je lever beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt en kan ook andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren. De arts zal ook je bloeddruk en hartfunctie opvolgen.



Als je je duizelig, zwak of moe voelt door de behandeling met Votrient®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Votrient® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Hoge bloeddruk
- ✓ Diarree
- ✓ Misselijkheid, braken, buikpijn
- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met als gevolg een verhoogd risico op infecties
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met als gevolg een verhoogd risico op bloedingen
- ✓ Hoofdpijn, vermoeidheid
- ✓ Verminderde eetlust, verstoorde smaak (dysgeusie)
- ✓ Gewichtsverlies
- ✓ Haaruitval (alopecia), haarkleurverandering
- ✓ Huiduitslag (rash), hypopigmentatie
- ✓ Roodheid en zwelling van de handpalmen en de voetzolen
- ✓ Aanwezigheid van eiwitten in de urine (proteïnurie)
- ✓ Leverproblemen (gezien in bloedafname)

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Votrient® hebt ingenomen
- ✓ Bij hoofdpijn in combinatie met verlies van spraak, verwarring, veranderd gezichtsvermogen, hoge bloeddruk, ...
- ✓ Bij plotselinge en ernstige verhoging van de bloeddruk met ernstige hoofdpijn, braken en wazig zicht
- ✓ Als je kortademigheid, hartkloppingen, een onregelmatige of versnelde hartslag, pijn of druk op de borst ervaart
- ✓ Als je merkt dat je huid of ogen geel worden, de urine donkerder wordt of als je erg misselijk bent of moet braken



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025