

Erleada® (apalutamide)



Erleada®, met apalutamide als werkzame stof, wordt gebruikt bij **prostaatkanker**.

Erleada® kan worden gebruikt bij uitgezaaide prostaatkanker die nog reageert op medicamenteuze of chirurgische behandeling die het testosterongehalte verlaagt (**hormoongevoelige prostaatkanker**), maar ook bij niet-gemetastaseerde prostaatkanker die niet meer reageert op medicamenteuze of chirurgische behandeling die het testosterongehalte verlaagt (**castratieresistente prostaatkanker**).



Erleada® werkt door het blokkeren van de activiteit van hormonen die androgenen heten (zoals testosteron). Androgenen kunnen groei van de kanker veroorzaken. Een gevolg van de effecten van androgenen te blokkeren is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.



Erleada® bestaat in tabletten van 60 mg en 240 mg apalutamide. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **240 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Erleada®



Neem Erleada® **ALTIJD MET** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname zonder voedsel, moet je de tabletten ten minste 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd innemen. Neem de tabletten iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in met een **glas water**. Je mag de tabletten **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem deze dan in zodra je eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen. Neem de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Je mag **geén twee doses op één dag innemen**.



Erleada® kan een wisselwerking geven met andere middelen. Als je tijdens je behandeling met Erleada® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



- Als je je ongewoon moe voelt door de behandeling met Erleada®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Toevallen kunnen een bijwerking van Erleada® zijn. Als u een hoger risico heeft op epileptische aanvallen, neem dan contact op met uw arts.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Erleada® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen zeer vaak voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ✓ Vermoeidheid | ✓ Opvliegers |
| ✓ Gewrichtspijn | ✓ Diarree |
| ✓ Huiduitslag (rash) | ✓ Botbreuken |
| ✓ Verminderde eetlust | ✓ Vallen |
| ✓ Hoge bloeddruk | ✓ Gewichtsverlies |



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Erleada® hebt ingenomen
- ✓ Als je last krijgt van pijn of een vervelend gevoel op de borst in rust of bij activiteit of van kortademigheid
- ✓ Als je rode, cirkelvormige vlekken op de romp, vaak met een blaar in het midden opmerkt
- ✓ Als je schilfering van de huid opmerkt
- ✓ Als er er zweren in of op de mond, keel, neus, geslachtsdelen of ogen zich vormen
- ✓ Als je tijdens de behandeling een epileptische aanval krijgt
- ✓ Als je valt, met mogelijks risico voor botbreuken



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 08/07/2025