

Xtandi® (enzalutamide)



Xtandi®, met enzalutamide als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van **prostaatkanker** wanneer een hormonale therapie (androgeendeprivatietherapie) niet meer aanslaat en chemotherapie niet toegepast kan worden of niet werkt.



Enzalutamide **verhindert de werking van bepaalde hormonen**, genaamd androgenen (zoals testosteron), in het lichaam. De groei van prostaatkankercellen is afhankelijk van deze hormonen. Enzalutamide remt op deze manier de groei van prostaatkankercellen.



Elke tablet Xtandi® bevat 40 mg enzalutamide. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **160 mg (4 tabletten)**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Xtandi® 40 mg



Neem Xtandi® **ALTIJD MET** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem je dit telkens ten minste 1 uur voor het eten of 2 uur na het eten.

Slik de tabletten **in hun geheel** door. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem de vergeten dosis dan meteen in zodra je eraan denkt. Als je de hele dag bent vergeten Xtandi® in te nemen, sla je de vergeten dosis over en ga je de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen. Neem onmiddellijk contact op met de behandelende arts als je langer dan één dag bent vergeten Xtandi® in te nemen.



Xtandi® kan een wisselwerking geven met verschillende middelen zoals amiodaron, domperidon... Bespreek met je arts wat je moet doen als je een van deze middelen neemt vooraleer je de behandeling met Xtandi® start.

Als je tijdens je behandeling met Xtandi® nog **andere medicatie, homeopathische middelen, kruiden of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



- Xtandi® kan slaperigheid en aandachtsstoornissen veroorzaken. Wees dus voorzichtig als je met een **voertuig rijdt** of **machines bestuurt** tijdens de behandeling met Xtandi®.
- Bij seksuele betrekkingen met een vruchtbare vrouw tijdens de behandeling en tot 3 maanden erna, moet je steeds een **condoom en een andere effectieve anticonceptiemethode** gebruiken. Bij seksuele betrekkingen met een zwangere vrouw tijdens de behandeling en tot 3 maanden erna, moet je een **condoom** gebruiken.
- 4/1000 patiënten doet een **epileptisch voorval** tijdens de behandeling. Stop onmiddellijk met je medicatie tijdens een voorval en raadpleeg een arts.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Xtandi® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Opvliegers
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Hoge bloeddruk



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Xtandi® hebt ingenomen
- ✓ Als je verergering van hoofdpijn ervaart, last krijgt van verwardheid, blindheid of andere problemen met je zicht
- ✓ Bij een epileptisch voorval

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

