

Celltop®, Vepesid® (etoposide)



Celltop® en Vepesid®, met etoposide als werkzame stof, worden gebruikt bij **verschillende types kanker** zoals **teelbalkanker**, **kleincellige longkanker** en **eierstokkanker**. Verder kunnen Celltop® en Vepesid® opgestart worden bij **acute myeloïde leukemie (AML)** en **Hodgkin** of **non-Hodgkin lymfomen**.



Etoposide bindt aan een specifiek eiwit, het zogenaamde topo-isomerase type 2, om zo de werking ervan te blokkeren. Hierdoor ontstaan er breuken in de erfelijke informatie van de cel (DNA). Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaat 1 soort Celltop® capsule: capsule met 50 mg etoposide; er bestaat 1 soort Vepesid® capsule die 100 mg etoposide bevat. De **dagelijkse dosis hangt af** van je **lichaamsoppervlakte** (berekend op basis van je lengte en gewicht) en het **gekozen behandelingschema**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid **éénmaal/tweemaal per dag** in **op een vast tijdstip** met een half glas water.

Dagelijkse dosis:

... mg = ... capsule(s) Celltop®/Vepesid® van ... mg per keer, eenmaal/tweemaal per dag

Celltop®/Vepesid® wordt toegediend per **cycclus van 21 tot 28 dagen**, volgens een **specifiek schema** (zie innameschema's op de laatste pagina).



Neem etoposide **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je Celltop® of Vepesid® moet innemen **ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten**. Slik de capsule(s) **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de capsules **niet openen**, **niet fijnmalen** of erop **kauwen**. Vermijd contact met de capsules door handschoenen te dragen en was de handen na inname.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Tijdens een behandeling met Celltop®/Vepesid® mag je geen **pompelmoes**, **sterfruit**, **granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Celltop®/Vepesid® nog **andere medicatie**, **kruiden**, **homeopathische middelen** of **voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Celltop®/Vepesid® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook klachten zoals kortademigheid en hoesten opvolgen.



- Als je je ongewoon moe, misselijk, duizelig of licht in het hoofd voelt door de behandeling met Celltop®/Vepesid®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Neem steeds contact op met je arts wanneer je een **vaccinatie** overweegt. Sommige vaccins geven immers een verhoogde kans op infecties, omdat het immuunsysteem verzwakt is door ziekte en/of behandeling. Het gebruik van deze vaccins is afgeraden.

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Celltop® en Vepesid® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen
- ✓ Bloedneus, blauwe plekken
- ✓ Vermoeidheid, algemene lichamszwakte
- ✓ Infecties
- ✓ Moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Buikpijn
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Veranderingen in de huidskleur (pigmentatie)
- ✓ Leverfunctiestoornissen (gezien in bloedafname)

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Celltop®/Vepesid® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij ernstig of aanhoudend braken of diarree



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 14/07/2025



Innameschema Celltop®/Vepesid®



Cyclus
... dagen

Celltop/Vepesid®

... mg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28



Cyclus
... dagen

Celltop/Vepesid®

... mg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Alternatief:



Cyclus
... dagen

Celltop/Vepesid® ...

mg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28