



Patiënteninformatie

Meningokokkenvaccinaties bij kinderen



1. Inleiding

Meningokokken zijn bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Deze infectie die soms aanvangt met vage symptomen kan razendsnel evolueren naar een levensbedreigende ziekte.

Bij kinderen jonger dan 5 jaar (in het bijzonder jonger dan 1 jaar) en adolescenten komt de ziekte het vaakst voor.

Meningokokkeninfecties komen gelukkig maar zelden voor. In 2019 waren er 107 gevallen van meningokokkeninfecties in België (1 op 100 000 inwoners). Gemiddeld telt België 11 sterftegevallen per jaar (2011-2016).

De belangrijkste types meningokokken in België zijn:

- Type B (49.5 %)
- Type Y (15.9 %)
- Type W (26.2%)
- Type C (7.5 %)

Type C meningokokken vaccin behoort tot het gratis vaccinatieprogramma en wordt meestal toegediend op 13 of 15 maanden leeftijd.

Twee beschikbare vaccins

Type B

Bexsero®

€ 86.52 per vaccin

Toedieningsschema:

leeftijd bij eerste dosis	primaire immunisatie	intervallen tussen doses van primaire immunisatie	booster
2 tem 5 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis tussen 12 en 15 m met een interval van minstens 6 maanden
6 tem 11 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis in het 2 e levensjaar met een interval van minstens 2 m
12 tem 23 maanden	2 doses	minstens 2 maanden	1 dosis met een interval van 12 tem 23 m
Vanaf 2 jaar	2 doses	minstens 1 maand	(enkel bij hoog risico op blootstelling)

Bexsero kan tegelijkertijd toegediend worden met andere vaccins van het gratis vaccinatieprogramma. Dit kan volgens 3 schema's, zie tabel basisvaccinatieschema. Op dit moment kan Kind en gezin dit vaccin **niet** toedienen en moet je hiervoor een afspraak bij je arts maken.






Door een verhoogd risico op koorts, gevoeligheid op de injectieplaats, verandering in eetgewoonten en prikkelbaarheid, wanneer Bexsero® gelijktijdig toegediend wordt met andere vaccins, kan overwogen worden om indien mogelijk de vaccinaties apart te geven. Preventief gebruik van paracetamol vermindert de kans op koorts en de ernst ervan.

Trumenba®

€76.98

Toedieningsschema: vanaf de leeftijd van 10 jaar: 2 dosissen met een interval van 6 maanden.

De belangrijkste bijwerkingen van beide Type B vaccins zijn:

-  Pijn
-  roodheid en zwelling op de injectieplaats
-  koorts
-  hoofdpijn
-  prikkelbaarheid
-  slaperigheid

Type ACWY




Dit vaccin behoort tot het basisvaccinatieschema en wordt GRATIS ter beschikking gesteld om toe te dienen op de leeftijd van 13 of 15 m.

Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om het voor de leeftijd van 12 maanden toe te dienen. Op dat moment is het niet gratis en moeten er 2 of 3 vaccins toegediend worden. Momenteel kan kind en gezin dit vaccin NIET toedienen aan kinderen jonger dan 12 maanden en kan je hiervoor terecht bij je arts.

Nimenrix®

€ 52,60 (vanaf 6 weken)

Toedieningsschema:






-  Leeftijd 6 weken - 6 maanden: 3 dosissen: tussen de 1e en 2e dosis een interval van 2 maanden, de 3e dosis op de leeftijd van 12 maanden.
-  Leeftijd 6 maanden - 12 maanden: 2 dosissen: 2 e dosis op de leeftijd van 12 maanden met een tussenperiode van minstens 2 maanden na het vorige vaccin.
-  Vanaf leeftijd 12 maanden: 1 dosis.

Menveo®

€ 52,60

Toedieningsschema: vanaf leeftijd 2 jaar: 1 dosis.

De belangrijkste bijwerkingen van beide Type ACWY vaccins zijn:

-  verminderde eetlust
-  prikkelbaarheid
-  hoofdpijn
-  koorts
-  zwelling roodheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats

Basisvaccinatieschema

leeftijd	2 m	(2,5 m)	3 m	4 m	(4,5 m)	5 m	12 m	(13 m)	15 m
Hexyon® (polio, tetanus, difterie, kinkhoest, hepatitis B en h. infl B)	x		x	x				(x)	x
Prevenar 13® (pneumokokken)	x		(x)	x			x		
Rotarix® (rotavirus)	x		x						
MMR® (mazelen, bof, rode hond)							x		
Neisvac C® (meningokokken C) of Nimenrix® (meningokokken ACWY)								(x)	x
Bexsero® (meningokokken B):									
schema 1	x			x			x		
schema 2		x			x			x	
schema 3			x			x		x	

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Raadpleging kinderziekten
 campus Sint-Jozef
 Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
 Route C35
 014 44 44 16

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11



V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) •
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout