



Kisqali®, met ribociclib als werkzame stof, wordt gebruikt bij vrouwen met een **hormoongevoelige, (HER2-) borstkanker als adjuvante** behandeling in vroeg stadium met hoog kans op recidief of als **onderhoudsbehandeling** indien de borstkanker **lokaal gevorderd of uitgezaaid** (gemetastaseerd) is naar andere delen van het lichaam. Kisqali® wordt steeds gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel: een aromataseremmer (vb. letrozol) of fulvestrant. Vrouwen die de menopauze nog niet hebben bereikt, krijgen bovenop deze combinatie nog een LHRH-agonist (vb. gosereline) toegediend.



Kisqali® remt in kankercellen specifieke eiwitten, de zogenaamde cyclineafhankelijke kinasen 4 en 6, die belangrijk zijn voor de groei en deling van cellen. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet Kisqali® bevat 200 mg ribociclib. Aanbevolen startdosis bij **adjuvante** therapie is **400mg (2 tabletten) eenmaal per dag**, terwijl dit bij **onderhoudsbehandeling 600 mg (3 tabletten) eenmaal per dag** is. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.

In combinatie met de aromataseremmer:

Neem de geneesmiddelen in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water. De geneesmiddelen worden toegediend per **cyclus van 28 dagen**. Je neemt Kisqali® in gedurende 21 dagen, gevolgd door 7 dagen waarop je **GEEN** Kisqali® inneemt. De aromataseremmer (letrozol) neem je elke dag in (zie innameschema).



Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Kisqali® 200 mg +
... mg = ... tablet letrozol (Femara®) 2,5 mg **OF**
... mg = ... tablet anastrozol (Arimidex®) 1,0 mg

In combinatie met fulvestrant:

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Kisqali® 200 mg

Injectie **fulvestrant (Faslodex®)** voor de **eerste cyclus** op **dag 1 en dag 15**.

Voor de **volgende cycli** enkel injectie op **dag 1** (i.e. maandelijkse injectie).



Neem Kisqali® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname zonder voedsel, doe je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten. Slik de tabletten in hun geheel door met een half glas water. Je mag de tabletten niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, sla dan de gemiste dosis over die dag en neem de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.

Bij **braken na inname** de dosis niet herhalen, maar de volgende dosis innemen volgens het gebruikelijke schema.



Tijdens een behandeling met Kisqali® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Kisqali® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker omdat Kisqali® wisselwerkingen kan geven met bepaalde geneesmiddelen.



Kisqali® kan de werking van je lever beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren. Je arts zal ook de werking van je hart opvolgen.



Tijdens je behandeling met Kisqali® moet je bijzonder voorzichtig zijn wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt. Een behandeling met Kisqali® kan namelijk vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Kisqali® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid, zwakte, bleke huid als gevolg
- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met risico op infecties als gevolg
- ✓ Pijn bij het plassen en vaak plassen (tekenen van urineweginfectie)
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Kortademigheid, hoesten
- ✓ Rugpijn
- ✓ Misselijkheid en braken, buikpijn
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond)
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Jeuk (pruritus)
- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid
- ✓ Vochtophoping, voornamelijk in enkels, benen, armen (oedeem)
- ✓ Leverproblemen

Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Kisqali® hebt ingenomen
- ✓ Bij pijn op de borst of borstkasklachten, veranderingen in de hartslag (sneller/trager), hartkloppingen, licht gevoel in het hoofd, flauwte, duizeligheid, blauwe verkleuring van de lippen, kortademigheid, zwelling aan onderbenen of van de huid
- ✓ Bij koorts, koude rillingen, zwakte en frequente infectie zoals pijn in de keel of zweertjes in de mond
- ✓ Bij vermoeidheid, jeukende gele huid, gele verkleuring van de huid of het oogwit, misselijkheid en braken, gebrek aan eetlust, pijn in de rechterbovenbuik, donkere of bruine urine of als je sneller dan normaal bloedingen of blauwe plekken krijgt



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025



Innameschema Kisqali®



Cyclus 28 dagen met aromatase- inhibitor	Kisqali® ... mg																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Cyclus 28 dagen met fulvestrant	Kisqali® ... mg																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
																													
																													

 Injectie Faslodex® bij elke cyclus op dag 1

 Injectie Faslodex® enkel voor de eerste cyclus op dag 15