



Patiënteninformatie

# Sulfasalazine

*Voorgeschreven door de reumatoloog*



# Inhoud

Inleiding .....	3
Werking.....	3
Het gebruik van sulfasalazine .....	3
Hoe bewaar ik sulfasalazine tabletten? .....	4
Controle .....	4
Bijwerkingen.....	4
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	5
Vaccinaties.....	5
Alcohol .....	5
Autorijden.....	6
Reisadvies .....	6
Zonlicht .....	6
Operaties .....	6
Gebruik van sulfasalazine samen met andere medicijnen.....	7
Startschema.....	7
Tot slot.....	7

## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u sulfasalazine gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking

Sulfasalazine is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde csDMARD (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drug) ofwel “ziektebeloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma.

Sulfasalazine wordt voorgeschreven aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en artritis psoriatica.

Sulfasalazine heeft een ontstekingsremmend effect. Het kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Het duurt ongeveer 6-12 weken voordat u iets zal merken van de werking van dit medicijn. Dit medicijn wordt vaak met andere medicijnen gecombineerd. Als blijkt dat u goed op sulfasalazine reageert, kunt u het vele jaren blijven gebruiken.

## Het gebruik van sulfasalazine

Sulfasalazine is een medicijn in tabletvorm van 500 mg. Het aantal tabletten dat u moet slikken, wordt geleidelijk opgehoogd. Dit is om de kans op bijwerkingen te verminderen. Uiteindelijk gebruikt u 4-6 tabletten per dag. Als na verloop van tijd de ziekteactiviteit (mate van de ontstekingen) laag is, wordt de dosering soms verlaagd.

De totale dosis wordt gespreid over 2 innames (‘s morgens en ‘s avonds).

De maagsapresistente tabletten (EC) mag u niet fijnmaken of erop kauwen.

Neem de tabletten bij voorkeur in tijdens de maaltijd voor een optimale opname.

Als u overgevoelig bent voor sulfonamide, meldt dit dan aan uw reumatoloog.

Stop niet zomaar met het gebruik van sulfasalazine. Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

## Hoe bewaar ik sulfasalazine tabletten?

De tabletten sulfasalazine bewaart u in de originele verpakking op een droge plaats bij een huiskamertemperatuur die onder de 30°C ligt.

## Controle

Tijdens de behandeling met sulfasalazine wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

## Bijwerkingen

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

- maagdarmklachten zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken en diarree. Deze klachten treden vooral tijdens het begin van de behandeling op.
- hoofdpijn en soms duizeligheid.
- overgevoelighedsreacties zoals huidafwijkingen, koorts of koude rillingen.
- oranjeverkleuring en/ of veranderde geur van de urine. Deze bijwerking is onschuldig.

Bijwerkingen van organen:

- bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Mocht u last hebben van een bijwerking of heeft u andere lichamelijke klachten waarvan u zich afvraagt of ze met het gebruik van sulfasalazine te maken hebben, neem dan contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige of reumatoloog.

## Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit medicijn kunnen mannen tijdelijk minder vruchtbaar zijn. Nadat de inname van dit medicijn gestopt is, wordt de spermaproductie weer normaal.

Bij vrouwen heeft sulfasalazine geen invloed op de vruchtbaarheid.

Indien noodzakelijk kan sulfasalazine voor en tijdens de zwangerschap gebruikt worden, mits een verhoogde inname van foliumzuur (4mg).

Sulfasalazine komt ook in de borstvoeding terecht.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Vaccinaties

Het jaarlijks griepvaccin en het pneumococcenvaccin worden aanbevolen.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

## Alcohol

Wees voorzichtig met alcoholgebruik.

Als u toch alcohol wilt gebruiken, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Autorijden

Sulfasalazine veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid.  
Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens het gebruik van sulfasalazine

## Reisadvies

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u sulfasalazine gebruikt. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Bewaar de medicatie op uw verblijfsadres zoals thuis, dus op kamertemperatuur en niet boven de 30°.

## Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van sulfasalazine. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

## Operaties

Als u geopereerd moet worden, kunt u meestal doorgaan met de sulfasalazine.

Als u diabetes heeft of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

# Gebruik van sulfasalazine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met sulfasalazine.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

## Startschema

Week .... neemt u ..... tabletten 's morgens en ..... tabletten 's avonds

Week .... neemt u ..... tabletten 's morgens en ..... tabletten 's avonds

Week .... neemt u ..... tabletten 's morgens en ..... tabletten 's avonds

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00** op het nummer **014/44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout