



Patiënteninformatie

Sulfasalazine

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u sulfasalazine gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt gelezen. Als u nog vragen hebt, kan u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking

Sulfasalazine is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde csDMARD (conventional synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel dat het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Sulfasalazine wordt voorgeschreven aan patiënten met een reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis en artritis psoriatica.

Sulfasalazine werkt ontstekingsremmend en helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Na 6-12 weken heeft u effect van sulfasalazine. Dit medicijn wordt vaak met andere medicijnen gecombineerd.

Het gebruik van sulfasalazine

Sulfasalazine is een medicijn in tabletvorm van 500 mg. Om de kans op bijwerkingen te verminderen wordt de dosis geleidelijk opgehoogd. Uiteindelijk gebruikt u 4-6 tabletten per dag. Als na verloop van tijd de ziekteactiviteit (mate van de ontstekingen) laag is, wordt de dosering soms verlaagd.

- De totale dosis wordt gespreid over 2 innames. U neemt dus twee keer tabletten op één dag: 's morgens en 's avonds.
- Neem de tabletten bij voorkeur in tijdens de maaltijd voor een optimale opname.
- Als u overgevoelig bent voor sulfonamide, meldt dit dan aan uw reumatoloog. Stop niet zomaar met het gebruik van sulfasalazine. Overleg dit eerst met uw reumatoloog.

Hoe bewaart u sulfasalazine tabletten?

Sulfasalazine bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

Controle

Tijdens de behandeling met sulfasalazine nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling controleren we u regelmatig. We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen

Sommige patiënten die sulfalazine nemen, krijgen last van volgende bijwerkingen:

- **Maagdarmklachten** zoals misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken en diarree. Deze klachten treden vooral tijdens het begin van de behandeling op.
- **Hoofdpijn** en soms **duizeligheid**.
- **Overgevoeligheidsreacties** zoals huidafwijkingen, koorts of koude rillingen.
- **Oranjeverkleuring** en/ of veranderde geur van de urine. Deze bijwerking is onschuldig.
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Tijdens het gebruik van dit medicijn kunnen mannen tijdelijk minder vruchtbaar zijn. Nadat u stopt met de inname van dit medicijn, wordt uw spermaproductie weer normaal.
- Bij vrouwen heeft sulfasalazine geen invloed op de vruchtbaarheid.
- Sulfasalazine komt ook in de borstvoeding terecht.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Het jaarlijks griepvaccin, COVID-vaccin en het pneumococcenvaccin worden aanbevolen.

We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Alcohol

Wees voorzichtig met alcoholgebruik.

Als u toch alcohol wilt gebruiken, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Autorijden

U mag autorijden tijdens het gebruik van sulfasalazine.

Reisadvies

Wij raden u af om naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Neem een actueel overzicht van uw medicijnen mee op reis (het medicijnpaspoort). Daarin staat dat sulfasalazine gebruikt op voorschrift van uw arts.

U kan een medicijnpaspoort vragen bij uw apotheek of eventueel bij uw arts.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV-straling tijdens het gebruik van sulfasalazine. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Als u geopereerd moet worden, kunt u meestal doorgaan met de sulfasalazine.

Als u diabetes heeft of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan uw arts preventief antibiotica voorschrijven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van sulfasalazine samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts en apotheek over uw behandeling met sulfasalazine.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt.

Startschema

Week neemt u tabletten 's morgens en tabletten 's avonds

Week neemt u tabletten 's morgens en tabletten 's avonds

Week neemt u tabletten 's morgens en tabletten 's avonds

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van **08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30** op het nummer **014 44 43 72**.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11



Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout



Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout