



Patiënteninformatie

# Baricitinib

*Voorgeschreven door de reumatoloog*



# Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding .....	4
Werking van baricitinib .....	4
Wanneer wordt baricitinib voorgeschreven?.....	4
Vorbereiding.....	5
Het gebruik van baricitinib.....	5
Hoe bewaar ik baricitinib? .....	5
Controle .....	5
Bijwerkingen van baricitinib.....	6
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding.....	6
Vaccinaties.....	7
Alcohol .....	7
Autorijden.....	7
Reisadvies .....	7
Operaties .....	8
Gebruik van baricitinib samen met andere medicijnen .....	8
Tot slot.....	9

## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u baricitinib gaat gebruiken.

In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van baricitinib

Baricitinib werkt door de activiteit te verminderen van een enzym in het lichaam dat 'januskinase' wordt genoemd en dat een rol speelt bij ontsteking.

Door de activiteit van dit enzym te verlagen, helpt baricitinib de pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten en vermoeidheid te verminderen en helpt het om schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten te vertragen.

Deze effecten kunnen u helpen uw dagelijkse activiteiten beter te verrichten waardoor ze de kwaliteit van leven van patiënten met reumatoïde artritis verbeteren

## Wanneer wordt baricitinib voorgeschreven?

Baricitinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis, een onstekingsaandoening van de gewrichten, als eerdere behandeling niet goed genoeg werkzaam was of niet verdragen werd.

Baricitinib kan alleen of samen met bepaalde andere geneesmiddelen worden gebruikt, zoals methotrexaat. De werking van baricitinib treedt op na 8 tot 12 weken. Soms duurt het echter langer en bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

## Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met baricitinib moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt onder ander in dat onderzocht wordt of u een TBC-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

## Het gebruik van baricitinib.

De aanbevolen dosering is 4 mg eenmaal per dag.

Uw arts kan u een lagere dosis van 2 mg eenmaal per dag geven, vooral als u ouder bent dan 75 jaar of als u een hogere kans op infecties heeft. Als het geneesmiddel goed werkt, kan uw arts besluiten de dosis te verlagen.

Als uw nieren minder goed werken, is de aanbevolen dosis baricitinib 2 mg eenmaal per dag.

Baricitinib is een tablet en moet u met wat water doorslikken.

U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.

Om u eraan te herinneren baricitinib in te nemen, vindt u het misschien gemakkelijker om het elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.

## Hoe bewaar ik baricitinib?

Baricitinib tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C.

## Controle

Tijdens de behandeling met baricitinib wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

## **Bijwerkingen van baricitinib.**

Hierna worden de meest voorkomende bijwerkingen beschreven:

**Infecties:** Patiënten die met baricitinib behandeld worden, zijn vatbaarder voor infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje) contact op met uw huisarts of reumatoloog.

**Bijwerkingen van organen:** bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek in de gaten houdt. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie en cholesterol

Maag- en darmklachten (zoals misselijkheid en/of diarree)

## **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de invloed van baricitinib op vruchtbaarheid en zwangerschap.

Baricitinib mag u daarom niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk daarom mag u geen borstvoeding geven als u baricitinib slikt. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met baricitinib .

Het jaarlijks griepvaccin en het pneumococcenvaccin worden aanbevolen.

We adviseren u om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te bespreken.

## Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met baricitinib.

## Autorijden

Baricitinib veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van baricitinib.

## Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van baricitinib naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Daarin staat dat u baricitinib vanwege medische noodzaak gebruikt.

Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

## Operaties

Als u geopereerd moet worden, overleg dan tijdig met uw reumatoloog

Als u diabetes hebt of geopereerd moet worden vanwege een infectie, kan antibiotica soms preventief worden gegeven. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

## Gebruik van baricitinib samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met baricitinib.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel uw apotheek ook altijd dat u baricitinib gebruikt.



## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag bellen met de reumaverpleegkundigen: tel.014 44 43 72 tussen 11.15 en 12.00 en tussen 15.30 en 16.30.

Op maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag kunt u ook de arts bereiken op haar telefonisch spreekuur: tel.014 44 43 72 tussen 7.30 en 8.00 uur

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites  
[www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)  
<http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>





**AZ Turnhout vzw**  
[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



**Campus Sint-Jozef**  
Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout  
014 40 60 11



**Campus Sint-Elisabeth**  
Rubensstraat 166  
2300 Turnhout  
014 40 60 11