

Endoxan® (cyclofosfamide)



Endoxan®, met cyclofosfamide als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van **multipel myeloom** (ziekte van Kahler), **kwaadaardige Hodgkin- of non-Hodgkin lymfomen** en **acute leukemie**. Verder kan Endoxan® opgestart worden voor de behandeling van **verschillende vaste tumoren**, voornamelijk: kleincellige longkanker, borstkanker, eierstokkanker, prostaatkanker en wekedelentumoren.



Endoxan® wordt in het lichaam omgezet tot specifieke metabolieten die in staat zijn de erfelijke informatie van de cel (DNA) te beschadigen/verstoren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Meestal wordt er gestart met een **intraveneuze of intramusculaire behandeling** met Endoxan® en wordt Endoxan® nadien toegediend onder de vorm van **tabletten**. Elke tablet Endoxan® bevat 50 mg cyclofosfamide. De aanbevolen **dagelijkse dosis** varieert van **50 tot 200 mg (1 tot 4 tabletten)**, afhankelijk van jouw algemene toestand, bloedwaarden en het resultaat van de behandeling.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag**, bij voorkeur 's **morgens**, met een glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) Endoxan® 50 mg



Neem Endoxan® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in, bij voorkeur 's morgens. Als je kiest voor een inname met voedsel, neem Endoxan® dan bij een lichte, geen te vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem Endoxan® dan ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten. Slik de tablet(ten) **in hun geheel** door met een **glas water**. Je mag de tablet(ten) **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**. Beperk alcoholgebruik tijdens je behandeling met Endoxan®.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, raadpleeg dan onmiddellijk het behandeld team. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet(ten) in te halen.



Tijdens een behandeling met Endoxan® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Endoxan® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Neem steeds contact op met je arts wanneer je een **vaccinatie** overweegt. Sommige vaccins geven immers een verhoogde kans op infecties, omdat het immuunsysteem verzwakt is door ziekte en/of behandeling. Het gebruik van deze vaccins is afgeraden.



- Als je je ongewoon moe voelt door de behandeling met Endoxan®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- **Drink voldoende** water tijdens je behandeling met Endoxan® (min. 2 liter per dag), om de urineproductie te bevorderen. Zo wordt Endoxan® sneller uitgeplast en zal het de blaas minder irriteren.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Endoxan® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen
- ✓ Vermoeidheid, algemene lichamszwakte
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Blaasontsteking (cystitis)
- ✓ Bloed in de urine (hematurie)
- ✓ Koorts



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Endoxan® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij tekenen van blaasontsteking, bloed in de urine
- ✓ Bij ernstig of aanhoudend braken



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

