

Imbruvica® (ibrutinib)



Imbruvica®, met ibrutinib als werkzame stof, wordt gebruikt bij verschillende types bloedkanker: **mantelcellymfoom** (type kanker van de lymfeklieren), **chronische lymfatische leukemie** (type kanker van bepaalde witte bloedcellen, waarbij ook de lymfeklieren betrokken zijn) of de **ziekte van Waldenström** (type kanker van bepaalde witte bloedcellen). Imbruvica® kan alleen gebruikt worden of in combinatie met andere geneesmiddelen.



Imbruvica® remt in het lichaam het Bruton's tyrosinekinase. Dit is een eiwit dat de kankercellen helpt te groeien en overleven. Door dit eiwit te remmen, helpt Imbruvica® de **kankercellen te doden** en zo hun **aantal te verminderen**. Het **vertraagt** ook de **verergering** van de kanker.



Elke capsule Imbruvica® bevat 140 mg ibrutinib. De tabletten bestaan in doses van 140, 280, 420 en 560 mg. De aanbevolen **dagelijkse dosis** hangt af van het **type bloedkanker**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag** op een vast tijdstip de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Imbruvica® 140 / 280 / 420 / 560 mg



Neem Imbruvica® **ALTIJD MET** of **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** Imbruvica® bent **vergeten**, dan kan je op dezelfde dag de vergeten dosis alsnog **zo snel mogelijk innemen**. Ga daarna op de volgende dag verder met je gebruikelijke schema. **Neem geen dubbele dosis** om de vergeten dosis in te halen.



Tijdens de behandeling met Imbruvica® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Imbruvica® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Imbruvica® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. De arts zal ook je hartritme en bloeddruk opvolgen.



Als je je duizelig of vermoeid voelt door de behandeling met Imbruvica®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt of een machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Imbruvica® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal witten bloedcellen en bloedplaatjes
- ✓ Bloedingen en blauwe plekken
- ✓ Bovenste luchtweginfectie, longontsteking
- ✓ Koorts
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Misselijkheid, braken
- ✓ Pijnlijke blaasjes of zweren in de mond (mondslijmvliesontsteking)
- ✓ Diarree of obstipatie
- ✓ Vochtophoping in handen, enkels of voeten (oedeem)
- ✓ Spier- en gewrichtspijn



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Imbruvica® hebt ingenomen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij bloedneus, blauwe plekken, bloed in de ontlasting of urine, zwaardere menstruaties, verwardheid
- ✓ Bij snelle hartslag, zwakke of onregelmatige hartslag (polsslag)
- ✓ Bij geheugenverlies, moeite met nadenken, problemen met lopen of afname van het gezichtsvermogen



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 04/07/2025