

Alecensa® (alectinib)



Alecensa®, met alectinib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van een type **longkanker** dat niet-kleincellige longkanker wordt genoemd. Het wordt gebruikt wanneer de longkanker veroorzaakt wordt door een specifieke genetische verandering (mutaties van het ALK-gen) en gevorderd is.



Alecensa® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Elke tablet Alecensa® bevat 150 mg alectinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **600 mg (4 tabletten) tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te veel doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag, op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een glas water. Zorg dat er ongeveer 12 uur zit tussen de twee innames.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsules Alecensa® 150 mg per keer, tweemaal per dag



Neem Alecensa® altijd in **met voedsel**. Slik de capsules in hun geheel door met een glas water. **Kauw niet** op de capsules en **open ze niet**.



Als je een **dosis** bent **vergeten** en het duurt nog 6 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de capsules dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 6 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over. Ga vervolgens verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsules in te halen.



Tijdens een behandeling met Alecensa® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Alecensa® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Alecensa® kan leverstoornissen en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren.



- Tijdens de behandeling met Alecensa® moet je bijzonder voorzichtig zijn wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt. Een behandeling met Alecensa® kan namelijk gezichtsstoornissen veroorzaken of leiden tot een vertraagde hartslag of lage bloeddruk, met mogelijks duizeligheid en flauwvallen tot gevolg.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht tijdens de behandeling en tot 7 dagen erna. Draag beschermende kledij en een zonnebrandcrème en lippenbalsem met beschermingsfactor 50+.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Alecensa® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen
- ✓ Vermoeidheid, algemene lichamszwakte
- ✓ Diarree
- ✓ Moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Gewichtstoename
- ✓ Spierpijn
- ✓ Vochtophoping, voornamelijk in enkels, benen, armen
- ✓ Leverfunctiestoornissen



Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Alecensa® hebt ingenomen
- ✓ Bij gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen, pijn in de rechterzijde van de maagstreek, donkere urine, jeukende huid, onverklaarbare kneuzingen of bloedingen en als je je minder hongerig of buitengewoon moe voelt
- ✓ Bij nieuwe of verergerde longklachten, zoals moeite met ademen, kortademigheid of hoesten met of zonder slijm, of koorts
- ✓ Bij flauwvallen, duizeligheid en lage bloeddruk
- ✓ Bij nieuwe of verergerde symptomen van spierproblemen, zoals onverklaarbare spierpijn of spierpijn die niet verdwijnt



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 70: apotheek
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versie 14/07/2025