

Iclusig® (ponatinib)



Iclusig®, met als werkzame stof ponatinib, wordt gebruikt bij de behandeling van **chronische myeloïde leukemie (CML)** of **Philadelphia-chromosoom-positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph⁺ ALL)** wanneer een eerdere behandeling niet langer werkt of wanneer je een bepaalde genetische verandering (T315I-mutatie) hebt. Leukemie is een bloedkanker waarbij de witte bloedcellen ongecontroleerd gaan groeien.



Iclusig® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 3 soorten Iclusig® tabletten: tabletten met 15 mg, 30mg en 45 mg ponatinib. Meestal wordt gestart met een **dagelijkse dosis** van **45 mg**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, als de gewenste respons is bereikt of wanneer de behandeling niet aanslaat, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet Iclusig® ... mg



Iclusig® ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel innemen, omdat de absorptie van Iclusig® en dus de plasmaspiegel anders kunnen variëren. Als je kiest voor inname met voedsel, kies dan voor een lichte, geen te vette maaltijd. Als je kiest voor inname zonder voedsel, neem Iclusig® dan ten minste 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd in.

Slik de tablet in zijn geheel door met een half glas water. Je mag de tablet niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet in te halen.



Tijdens een behandeling met Iclusig® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Iclusig® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Iclusig® kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. Je arts zal ook je bloeddruk, gezichtsvermogen en hartfunctie opvolgen.



Als je je duizelig, zwak of moe voelt of je zicht veranderd is door de behandeling met Iclusig®, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Iclusig® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Hoge bloeddruk
- ✓ Infectie van de bovenste luchtwegen, hoesten, kortademigheid
- ✓ Koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met een verhoogd risico op infecties tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met een verhoogd risico op bloedingen en blauwe plekken tot gevolg
- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid en zwakte tot gevolg
- ✓ Misselijkheid, braken, buikpijn
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid
- ✓ Huiduitslag (rash), droge huid, jeuk
- ✓ Vochtophoping in de benen, enkels of voeten (oedeem)
- ✓ Spier- en gewrichtspijn, spierspasmen, botpijn, rugpijn en pijn in de ledematen
- ✓ Levertoxiciteit: verhoogde leverenzymen (ALAT en ASAT)
- ✓ Verhoogd lipase

Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Iclusig® hebt ingenomen
- ✓ Bij hevige pijn in de buik en rug
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, pijnlijke keel of zweren in de mond, ademhalingsstoornissen (hoesten, piepende ademhaling, ...)
- ✓ Als je kortademigheid, hartkloppingen, een onregelmatige of versnelde hartslag, pijn of druk op de borst ervaart
- ✓ In geval van een gezwollen of rode zone op je huid die warm en gevoelig is
- ✓ Bij blozen, roodheid in het gezicht, pijn in de benen en armen, koude handen en voeten
- ✓ Bij blauwe plekken, bloed ophoesten of bloed in de stoelgang



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 70: apotheek
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versie 17/07/2025