

Lynparza® (olaparib) - tabletten



Lynparza® tabletten, met als werkzame stof olaparib, worden gebruikt voor de behandeling van **eierstokkanker** bij patiënten die eerder gedeeltelijk of volledig reageerden op platinabevattende chemotherapie. Daarnaast kunnen Lynparza® tabletten ook gebruikt worden voor de behandeling van **borstkanker** bij patiënten die eerder werden behandeld met chemotherapie en niet in aanmerking komen voor verdere anti-hormonale behandeling. Lynparza® wordt enkel gebruikt bij patiënten bij wie een specifieke genetische verandering (mutatie in het BRCA gen) werd aangetoond.



Lynparza® remt een bepaald eiwit, namelijk het poly-adenosinedifosfaat-ribose-polymerase (PARP), in kankercellen. PARP is een belangrijk eiwit bij het herstellen van de erfelijke informatie van de cel (DNA). Door PARP te blokkeren zullen **kankercellen afsterven**.



Er bestaan 2 soorten Lynparza® tabletten: tabletten met 100 mg olaparib en tabletten met 150 mg olaparib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **300 mg tweemaal per dag**. Als de nevenwerkingen te veel doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **tweemaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis, met een half glas water.

Ochtenddos: ... mg = ... tablet(ten) Lynparza® ... mg

Avonddos: ... mg = ... tablet(ten) Lynparza® ... mg



Je mag Lynparza® met of zonder voedsel innemen. Slik de tabletten Lynparza® in hun geheel door. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema (gebruikelijke dosis op het volgende vaste tijdstip). Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen.



Tijdens je behandeling met Lynparza® mag je **geen pompelmoes, sterfruit, granaatappel** en producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Lynparza® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Lynparza® kan de samenstelling van het bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.



Als je je duizelig, zwak of vermoeid voelt door de behandeling met Lynparza®, wees dan **bijzonder voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lynparza® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):



- ✓ Te weinig rode bloedcellen (anemie) met als gevolg vermoeidheid en algemene lichamszwakte (asthenie)
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Duizeligheid
- ✓ Hoest
- ✓ Verlies van eetlust
- ✓ Smaakveranderingen
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Diarree

Contacteer het behandelend team :



- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je koorts ($> 38^{\circ}\text{C}$) hebt of tekenen van een infectie
- ✓ Als je blauwe plekken of bloedingen langer duren dan normaal
- ✓ Bij ernstige of aanhoudende diarree
- ✓ Als je kortademig bent, je zeer moe voelt, een bleke huid of een snelle hartslag hebt
- ✓ Als volgende symptomen voor het eerst optreden of verergeren: kortademigheid, hoesten of een piepende ademhaling
- ✓ Als je een allergische reactie hebt, te herkennen aan: slik- of ademhalingsproblemen, duizeligheid, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025