



Patiënteninformatie

Abatacept subcutaan

Voorgeschreven door de reumatoloog


az turnhout

Inhoud

Inleiding	4
Werking van abatacept	4
Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?	4
Vorbereiding	5
Het gebruik van abatacept	5
Hoe bewaar ik van abatacept?	5
Controle	5
Bijwerkingen van abatacept	6
Zwangerschap en borstvoeding	6
Vaccinaties	6
Alcohol	7
Autorijden	7
Reisadvies	7
Zonlicht	8
Operaties	8
Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen	8
Abatacept en diabetes	9
Tot slot	10

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u abatacept gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

Werking van abatacept

Abatacept is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARDs (biological Disease Modifying Antirheumatic Drugs), ofwel “ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma”.

Bloed bestaat onder andere uit witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. Ze spelen ook een rol bij het ontstaan van gewrichtsontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis. De witte bloedcellen bestaan uit verschillende soorten cellen, bijvoorbeeld T-lymfocyten.

Abatacept is een eiwit dat interfereert met de activiteit van de T-lymfocyten. Hiermee wordt het ontstekingsproces tot rust gebracht.

Abatacept kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?

Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Abatacept kan voorgeschreven worden aan patiënten waarbij andere reumamedicijnen tegen reumatoïde artritis onvoldoende helpen.

Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met abatacept moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit betekent dat onder andere onderzocht wordt of u in het verleden een tuberculose infectie of hepatitis hebt gehad.

Het gebruik van abatacept

Abatacept wordt via subcutane injecties (onderhuidse spuiten) gegeven via een voorgevulde pen. Dit is meestal wekelijks. U leert hoe u dit zelf moet doen.

Hoe bewaar ik van abatacept?

Bewaar dit medicijn in de koelkast (2-8°C). Laat deze vóór toediening eerst 30 min op kamertemperatuur komen.

Controle

Tijdens de behandeling met abatacept wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

Bijwerkingen van abatacept

Allergische reacties kunnen optreden na gebruik met abatacept. U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of verlaging.

Klachten van de huid op de plaats waar de injectie wordt toegediend. Denk aan roodheid, zwelling, jeuk, blauwe plekken of pijn. Dit is vrij altijd mild en vermindert meestal in de loop van de behandeling. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met de reumaverpleegkundige.

Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Patiënten die met abatacept behandeld worden, zijn vatbaarder voor infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje) contact op met uw huisarts of reumatoloog.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met abatacept. Het griepvaccinatie en pneumokokken vaccinatie worden aanbevolen. Bespreek dit met uw huisarts. We adviseren om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met abatacept.

Autorijden

Abatacept zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van abatacept.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van abatacept naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen.

Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Deze medicatie moet koel bewaard worden tussen +2°C en +8°C en mag in geen geval getransporteerd worden in de bagageruimte van het vliegtuig.

Neem daarom een reisdocument mee waarop uw arts meldt dat u behandeld moet worden met abatacept in de vorm van een voorgevulde pen en dat het daarom noodzakelijk is om dit geneesmiddel mee te nemen in uw handbagage.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van abatacept. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

Operaties

Er is in theorie een verhoogd risico op infecties na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u abatacept gebruikt. Als u een geplande operatie moet ondergaan, adviseren wij u om twee maanden voor deze operatie geen abatacept meer te gebruiken. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer abatacept gaan gebruiken.

Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met abatacept.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel uw apotheek ook altijd dat u abatacept gebruikt.

Abatacept en diabetes

Sommige meetsystemen voor bloedsuikers kunnen een verkeerde uitslag geven door de maltose (een soort suiker) die in abatacept zit.

Dit is bij meters die zijn gebaseerd op glucose dehydrogenase pyroloquinone (GDH-PQQ). U kunt dit nakijken op de verpakking of in de handleiding van uw meetstelsel.

Als u afwijkende bloedsuikers heeft, overleg dan met de arts die u insuline voorschrijft of u de dosering moet aanpassen.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de reumaverpleegkundigen, tel. 014 44 43 72. – tussen 11.15 – 12.00. Op deze dagen kunt u tussen 7.30 en 8 uur ook de arts bereiken op haar telefonisch spreekuur, tel. 014 44 43 72.

Voor meer informatie over abatacept kan u de bijgeleverde patiëntenbijsluiter raadplegen.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

www.bcfi.be

<http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be
info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11