

Fluorouracil® (5FU)



Uw therapie Fluorouracil® is een geneesmiddel (cytostaticum) dat de groei van de kankercellen remt.



De behandeling wordt in het oncologisch dagziekenhuis via infusie toegediend.
Dit gedurende 10 minuten.

Ook kan de toediening thuis verder gezet worden via een elastomeerpomp.
De fluorouracil kan dan toegediend worden over 1 of meerder dagen.

De verpleegkundige/ arts zal u hier meer informatie over geven.

Mogelijke interacties



- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts

Mogelijke bijwerkingen:



- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Verminderde eetlust
- Aantasting beenmerg
- Hand- voet syndroom
- Haaruitval
- Vermoeidheid
- Kortademigheid
- Aantasting mondslijmvlies



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (zoals: urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- ✓ Urine: Zittend plassen, toilet doortrekken met bril naar beneden, toilet tweemaal doortrekken.
- ✓ Sperma / vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: Zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: