

CHOP



Uw therapie bestaat uit drie celremmende geneesmiddelen: Cyclofosfamide, Vincristine, Doxorubicine. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



Verloop van de therapie

U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. De therapie wordt driewekelijks toegedient.

- ✓ Eén cyclus duurt 21 dagen en omvat 1 dag van toediening. Dag één is altijd de eertse dag van een nieuwe cyclus.



Mogelijke interacties

Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is aan te raden voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) de dagen na de toediening om de afvalstoffen te kunnen afvoeren.

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede (VB: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang.
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken, obstipatie of diarree
- ✓ Griepachtige verschijnselen en koorts tot 24 u na de chemo
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Roodverkleuring van de urine, traanvocht is mogelijk door doxorubicine tot enkele dagen na de therapie. (vermijd het dragen van contactlenzen)
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Tintelingen en voos gevoel in tenen en vingertoppen
- ✓ Huidveranderingen
- ✓ Tijdelijke smaak en geurverandering
- ✓ Invloed op seksualiteit, vruchtbaarheid en menstruatie
- ✓ Bijwerkingen ten gevolge van inname van corticosteroïden (vb. rood aangezicht, slaapproblemen,...)



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten:

Enkele tips:

Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden.

Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen

Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie