

Abiraterone (Zytiga®)



Abiraterone, is een soort hormonale therapie die wordt gebruikt om prostaatkanker te behandelen die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.



Abirateron **verhindert de aanmaak van** het hormoon **testosteron** in het lichaam. De groei van de prostaatkankercellen is afhankelijk van testosteron. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor afsterven.



Elke tablet bevat 500 mg abiraterone. De aanbevolen **dagelijkse dosis** bedraagt **1000 mg**. Om de behandeling met abiraterone beter te verdragen moet je bijkomend een lage dosis corticosteroïd ('cortisone') innemen zoals **prednison of prednisolon** (5 mg of 10 mg per dag). Wanneer je abiraterone krijgt voorgeschreven in een vroeg stadium waarin de ziekte nog reageert op hormoonbehandeling, wordt abiraterone gecombineerd met **een behandeling die de testosteronspiegel verlaagt** (d.i. androgeendeprivatietherapie). Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **eenmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tablet(ten) abiraterone 500 mg
... mg = ... capsule(s) prednison/prednisolon **'s morgens**



Neem abiraterone **ALTIJD ZONDER voedsel** in. Dit betekent dat je abiraterone moet innemen **ten minste 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd**. Slik de tabletten **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de tabletten **niet breken, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.

Prednison/prednisolon neem je best bij een maaltijd zoals het ontbijt.



Als je **vergeet** om abiraterone of prednison/prednisolon **in te nemen**, sla dan de gemiste dosis over die dag en neem dan de volgende dag de gebruikelijke dosis. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tabletten in te halen. Als je langer dan 1 dag bent vergeten om abiraterone of prednison/prednisolon in te nemen, raadpleeg dan meteen jouw arts.



Tijdens een behandeling met abiraterone mag je volgende middelen niet gebruiken: **spironolacton, fenytoïne, carbamazepine, rifampicine** of **preparaten op basis van Sint-Janskruid**. Bespreek met je arts wat je moet doen als je een van deze middelen neemt vooraleer je de behandeling met Zytiga® start.

Aangezien abiraterone een wisselwerking kan geven met andere middelen, is het belangrijk om tijdens je behandeling met abiraterone te melden aan je arts en apotheker welke **andere medicatie, homeopathische middelen, kruiden of voedingssupplementen** je inneemt of overweegt in te nemen.



Abiraterone kan de werking van je lever beïnvloeden zonder dat je hiervan iets merkt, en kan ook andere klachten veroorzaken. Je arts zal daarom regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren. Daarnaast zal de arts ook je bloeddruk, kaliumgehalte en mogelijke vochtophoping opvolgen.



Zoals elk geneesmiddel kan ook abiraterone bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Vochtophoping in de benen of voeten (oedeem)
- ✓ Verhoogde bloeddruk
- ✓ Frequent moeten plassen, pijn bij het plassen (tekenen van urineweginfectie)
- ✓ Diarree
- ✓ Leverfunctiestoornissen (gezien in bloedafname)
- ✓ Laag kaliumgehalte in het bloed met als gevolg spierzwakte, spierpijn of spierkrampen (eerst in bovenbenen en armen), hartkloppingen, vermoeidheid en buikklachten



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je teveel van abiraterone hebt ingenomen
- ✓ Als je hartkloppingen of een onregelmatige of versnelde hartslag ervaart
- ✓ Als je spierzwakte of spierkrampen ervaart
- ✓ Bij kortademigheid, snelle gewichtstoename en/of gezwollen voeten, enkels of benen
- ✓ Als je merkt dat je huid of ogen geel worden, de urine donkerder wordt of als je erg misselijk bent of moet braken. Dit kunnen tekenen zijn van leverproblemen.



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie