

Temozolomide



Temozolomide wordt gebruikt voor de behandeling van specifieke vormen van **hersentumoren, zoals maligne glioom**, zoals multiform glioblastoom of anaplastisch astrocytoma. Temozolomide wordt gebruikt indien deze tumoren terugkomen of verergeren na standaardbehandeling.



Temozolomide wordt in het lichaam omgezet tot specifieke producten die in staat zijn de erfelijke informatie van de cel (DNA) te beschadigen. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 6 soorten Temozolomide capsules: capsules met 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg en 250 mg. De aanbevolen dagelijkse dosis hangt af van je **lichaamsoppervlakte** (berekend op basis van je lengte en gewicht). Als de nevenwerkingen te veel doorwegen, kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid **éénmaal per dag** in **op een vast tijdstip buiten de maaltijd**, met een glas water.

Temozolomide wordt ingenomen volgens een cyclus van 28 dagen. Neem Temozolomide in op de eerste 5 dagen. Daarna neem je gedurende 23 dagen **GEEN** Temozolomide in (zie innameschema).

Dagelijkse dosis : ... mg = ... capsule(s) Temozolomide ... mg



Temozolomide mag je **NIET innemen met voedsel**. Dit betekent dat je Temozolomide ten minste **1 uur voor of 2 uur na de maaltijd** moet innemen. Je mag de capsules niet openen, fijnmaken of erop kauwen. Bij contact van de poederinhoud met de huid, ogen of neus onmiddellijk spoelen water (en zeep).



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem de capsule(s) dan meteen in zodra je eraan denkt. Ga de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Temozolomide kan een wisselwerking geven met andere geneesmiddelen. Bespreek met je arts welke andere geneesmiddelen je neemt vooraleer je de behandeling met Temozolomide start.

Als je tijdens je behandeling nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Temozolomide kan de samenstelling van je bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.



Als je je moe of slaperig voelt door de behandeling met Temozolomide, wees dan bijzonder voorzichtig wanneer je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Temozolomide nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal witte bloedcellen met als gevolg verhoogd risico op infecties
- ✓ Verminderd aantal bloedplaatjes met als gevolg verhoogd risico op bloedingen
- ✓ Verminderde eetlust (anorexia)
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Huiduitslag (rash), jeuk
- ✓ Haaruitval (alopecia)



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Temozolomide hebt ingenomen
- ✓ Bij een allergische reactie: slik- of ademhalingsproblemen, piepende ademhaling, zwelling van lippen, tong, gezicht, ernstige jeuk gepaard met rode huiduitslag, pijnlijke zwellingen van de huid (netelroos)
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts (38°C), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Als je ernstige hoofdpijn hebt die niet overgaat
- ✓ Bij kortademigheid, hoesten



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.





Innameschema Temozolomide



Cyclus 28
dagen

van .../.../...
tot .../.../...

Temodal® ... mg		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28