

Cabometyx® (cabozantinib)



Cabometyx®, met cabozantinib als werkzame stof, wordt gebruikt bij gevorderde stadia van niercelcarcinoom, een soort **nierkanker**. Daarnaast wordt Cabometyx® ook gebruikt bij volwassenen met leverkanker, die eerder behandeld werden met een specifiek antikankergeneesmiddel (sorafenib) en bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd gedifferentieerd schildklierkarcinoom (DTC).



Cabometyx® bindt in kankercellen aan specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen, om zo de werking ervan te blokkeren. Deze proteïnekinasen zijn betrokken bij de groei van cellen en de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten die deze cellen bevoorraden. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en daardoor **afsterven**.



Er bestaan 3 soorten Cabometyx® tabletten: tabletten met 20 mg, 40 mg en 60 mg cabozantinib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **60 mg éénmaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een glas water.

Dagelijkse dosis: mg = ... tablet Cabometyx® ... mg



Neem Cabometyx® **ALTIJD ZONDER** voedsel in. Dit betekent dat je Cabometyx® **ten minste 1 uur vóór of 2 uur na het eten** moet innemen. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. Je mag de tablet niet breken, fijnmalen of erop kauwen.



Als je een **dosis** bent **vergeten** en het duurt nog 12 uur of langer tot je de volgende dosis moet innemen, neem de tablet dan meteen in zodra je eraan denkt. Als het minder dan 12 uur duurt tot je je nieuwe dosis moet innemen, sla je de vergeten dosis over en ga je de volgende dag verder volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten tablet in te halen.



Tijdens een behandeling met Cabometyx® mag je geen **pompelmoes, sterfruit, granaatappel** of producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Als je tijdens je behandeling met Cabometyx® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Cabometyx® kan een hoge bloeddruk, nierproblemen en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een urineanalyse en bloedafname uitvoeren. Je arts zal ook de werking van je hart controleren.



Als je je moe of zwak voelt door de behandeling met Cabometyx®, wees dan bijzonder voorzichtig als je een voertuig bestuurt of een machine gebruikt.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Cabometyx® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderd aantal rode bloedcellen met vermoeidheid en algemene lichaamszwakte tot gevolg
- ✓ Verminderde eetlust, abnormale smaak in de mond
- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid
- ✓ Verhoogde bloeddruk, bloeding
- ✓ Hand-voet syndroom: pijnlijke roodheid en zwelling, prikkelend, tintelend of brandend gevoel, blaarvorming t.h.v. handpalmen en voetzolen
- ✓ Huiduitslag (rash)
- ✓ Verminderde schildklieractiviteit (hypothyreoïdie)
- ✓ Kortademigheid (dyspneu), hoesten
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Gewichtsverlies
- ✓ Mondslijmvliesontsteking (pijn en blaasjes of zweertjes in de mond)
- ✓ Heesheid, problemen met praten
- ✓ Vochtophoping in de benen, enkels of voeten (oedeem)
- ✓ Leverproblemen



Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Cabometyx® hebt ingenomen
- ✓ Bij mogelijke tekenen van een maagdarmp perforatie: pijn in de onderbuik, misselijkheid, braken, moeilijke stoelgang of koorts
- ✓ Bij een ernstige bloeding of een bloeding die niet onder controle kan gebracht worden met symptomen zoals: bloed braken, zwarte stoelgang, bloed in urine, bloed ophoesten, hoofdpijn, ...
- ✓ Bij zwelling, pijn aan je handen of voeten of kortademigheid
- ✓ Bij een wonde die niet geneest
- ✓ Bij een epileptische aanval, hoofdpijn, verwardheid of concentratieproblemen
- ✓ Bij ernstige of aanhoudende diarree



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025