

Cisplatine (Platinol®)



Uw therapie bestaat uit het celremmend middel: Cisplatine. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. Cisplatine kan wekelijks of driewekelijks worden toegediend.

Wekelijks: één cyclus duurt zeven dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.

Driewekelijks: één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus.



Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor een verhoogde kans op infecties, bloedarmoede, bloedingen (vb: sneller blauwe plekken, een bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Tijdelijke smaakverandering
- ✓ Ontsteking van het mondslijmvlies
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Huidveranderingen
- ✓ Licht haarverlies
- ✓ Tintelingen en zenuwpijnen
- ✓ Oorsuizingen en verminderd gehoor



Aandachtspunten

U krijgt veel vocht toegediend bij deze behandeling, dit is belangrijk voor uw nieren. Het kan zijn dat de verpleegkundige tijdens deze behandeling nauwlettend de hoeveelheid urine die u plast opvolgen.



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (zoals: urine, ontlasting, wondvocht, traanvocht, transpiratie, sperma en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten. Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden
- ✓ Sperma/ vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie