

MITOMYCINE



Uw therapie Mitomycine®: is een geneesmiddel (cytostaticum) dat de kankercellen remt



Hoe wordt Mitomycine® toegediend :

De behandeling wordt in het oncologisch dagziekenhuis via infusie toegediend.
De infusie loopt gedurende 30 minuten.



Mogelijke interacties

- ✓ Vermijd je het eten of drinken van pomelmoes(sap), en het gebruik van preparaten op basis van sint-Janskruid (sint-janskruid bestaat onder andere in druppels en tabletten van A.Vogel)
- ✓ Alcohol gedurende 1 dag voor en 2 dagen na therapie vermijden



Bijwerkingen Mitomycine®:

- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Beenmergsuppressie
- ✓ Hoesten , dyspnoe
- ✓ Huiduitslag
- ✓ Hand- voet syndroom
- ✓ Licht haarverlies
- ✓ Aantasting mondslijmvlies



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van cytostatica bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden
- ✓ Sperma/vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: