Talzenna® (talazoparib)

Talzenna® capsules, met als werkzame stof talazoparib, worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een vorm van borstkanker die HER2-negatieve borstkanker wordt genoemd en die een afwijkend overgeërfd BRCA-gen hebben. Talzenna® wordt gebruikt wanneer de kanker zich buiten de oorspronkelijke tumor of naar andere delen van het lichaam heeft verspreid.

Talzenna® remt bepaalde eiwitten, namelijk het poly-adenosinedifosfaat-ribose-polymerase (PARP 1 en 2), in kankercellen. PARP is een belangrijk eiwit bij het herstellen van de erfelijke informatie van de cel (DNA). Door PARP te blokkeren zullen **kankercellen afsterven**.

Er bestaan 2 soorten Talzenna® capsules: capsules met 0,25 mg en 1 mg talazoparib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **1 mg éénmaal per dag**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.

Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip** de aanbevolen dosis, met een glas water.

Dagelijkse dosis: … mg = … capsule Talzenna® … mg

Neem Talzenna® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vettige maaltijd. Als je het geneesmiddel zonder voedsel wenst in te nemen, doe je dit telkens ten minste 1 uur voor het eten of 2 uur na het eten. Slik de capsules **in hun geheel** door met een **glas water**. Je mag de capsules **niet openen, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.

Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.

Als je tijdens je behandeling met Talzenna® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.

Talzenna® kan de samenstelling van het bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig een **bloedafname** plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren.
Er moet maandelijks onder medisch toezicht een **zwangerschapstest** worden uitgevoerd.

Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande info kan nooit gebruikt worden ter vervanging van een medisch advies van een arts of van de patiëntenbijsluiter. Meer informatie binnenkort beschikbaar op www.educontact.be .

- Als je je duizelig, zwak of vermoeid voelt door de behandeling met Talzenna®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Talzenna® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Lage aantallen witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes
- ✓ Verminderde eetlust
- ✓ Duizeligheid
- ✓ Hoofdpijn
- ✓ Misselijkheid (nausea)
- ✓ Overgeven (braken)
- ✓ Diarree
- ✓ Buikpijn
- ✓ Haaruitval

Contacteer het **behandelend team** :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Talzenna® hebt ingenomen
- ✓ Als je koorts (≥ 38 °C) hebt of tekenen van een infectie
- ✓ Als je blauwe plekken of bloedingen hebt die langer duren dan normaal
- ✓ Bij ernstige of aanhoudende diarree
- ✓ Als je kortademig bent, je zeer moe voelt, een bleke huid of een snelle hartslag hebt
- ✓ Als volgende symptomen voor het eerst optreden of verergeren: kortademigheid, hoesten of een piepende ademhaling
- ✓ Als je een allergische reactie hebt, te herkennen aan: slik- of ademhalingsproblemen, duizeligheid, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag

Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
014 40 60 81: klinisch apotheker
014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum 08/07/2025

Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande info kan nooit gebruikt worden ter vervanging van een medisch advies van een arts of van de patiëntenbijsluiter. Meer informatie binnenkort beschikbaar op www.educontact.be .