

Bleomycine



Uw therapie bestaat uit het **celremmend middel: Bleomycine**. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.

Bleomycine kan wekelijks, 2-wekelijks of 3-wekelijks worden toegediend, afhankelijk van de combinatie therapie die uw arts heeft voorgeschreven.

Het infuus loopt over 30 min.



Aandachtspunten

Bleomycine kan schadelijk zijn voor de longen. Uw arts zal mogelijks een longfunctie onderzoek laten uitvoeren. Het is belangrijk dat u stopt met roken.

Bespreek ook met uw arts als u een sport beoefent zoals diepzeeduiken en bergbeklimmen.

U mag na een behandeling met bleomycine GEEN zuivere zuurstof meer gebruiken

Mogelijke interacties



- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pomelmoes, granaatappel of sterfruit
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans op infecties, bloedarmoede (VB: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Huid en nagelveranderingen
- ✓ Allergische reactie zoals kortademigheid, jeuk, rillingen, beklemmend gevoel borst
- ✓ Koorts: 4 tot 10u na de toediening en kan 24u aanhouden.



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden.
- ✓ Sperma/vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie.