

Erivedge® (vismodegib)



Erivedge®, met vismodegib als werkzame stof, wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaald type huidkanker, **uitgebreid basaalcelcarcinoom** genaamd. Erivedge® wordt gebruikt wanneer de kanker zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam (gemetastaseerd) of wanneer het zich verspreid heeft naar gebieden in de buurt (lokaal uitgebreid) en je arts besluit dat radiotherapie of chirurgie niet geschikt is.



Erivedge® bindt aan één van de belangrijkste eiwitten die betrokken zijn bij het ontstaan van basaalcelcarcinoom, het zogenaamde 'Smoothened' transmembraan-eiwit (SMO), om zo de werking ervan te blokkeren. Een gevolg hiervan is dat de **kankercellen niet meer** in staat zijn om te **groeien** of om zich te **vermenigvuldigen** en **daardoor afsterven**.



Elke capsule Erivedge® bevat 150 mg vismodegib. De aanbevolen **dagelijkse dosis** is **150 mg (1 capsule)**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem de aanbevolen hoeveelheid in **op een vast tijdstip éénmaal per dag** met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... capsule Erivedge® 150 mg



Neem Erivedge® **ALTIJD MET of ALTIJD ZONDER voedsel** in. Als je kiest voor een inname met voedsel, neem je best een licht verteerbare, weinig vette maaltijd. Als je het geneesmiddel zonder voedsel wenst in te nemen, doe je dit telkens ten minste 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten.

Slik de capsule **in zijn geheel** door met een **half glas water**. Je mag de capsule **niet openen, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema (gebruikelijke dosis, de volgende dag op het vaste tijdstip). Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule in te halen.



Tijdens een behandeling met Erivedge® mag je geen producten op basis van **Sint-Janskruid** gebruiken.

Erivedge® geeft een wisselwerking met onder andere dexamethason, bepaalde anti-epileptica,... meld daarom tijdens je behandeling met Erivedge® steeds aan je arts of apotheker welke **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** je inneemt of overweegt in te nemen.



Erivedge® kan huidtoxiciteiten veroorzaken en heeft mogelijk schadelijke effecten op het ongeboren kind. Daarom zal de arts regelmatig je huid controleren en moet er maandelijks onder medisch toezicht een **zwangerschapstest** worden uitgevoerd.



Tijdens de behandeling met Erivedge® mag je **NIET zwanger zijn of worden**. Vrouwen moeten **effectieve anticonceptie** gebruik tijdens de behandeling en tot 24 maanden erna. Bij mannen is effectieve anticonceptie vereist tijdens de behandeling en tot 2 maanden erna, zelfs na vasectomie.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Erivedge® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten):

- ✓ Verminderde eetlust, gewichtsverlies
- ✓ Abnormale/verminderde smaak in de mond
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Diarree of moeilijke stoelgang (obstipatie)
- ✓ Huiduitslag (rash), jeuk
- ✓ Haaruitval (alopecia)
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Wegblijven van menstruatie (amenorroe)
- ✓ Spierkrampen, gewrichtspijn of pijn in de benen en armen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Erivedge® hebt ingenomen
- ✓ Als je veranderingen van je huid waarneemt
- ✓ Als tijdens de behandeling of tot 24 maanden erna je denkt dat de anticonceptie om eender welke reden niet heeft gewerkt, je menstruatie stopt, je bent gestopt met het gebruik van anticonceptie of je van anticonceptie moet veranderen
- ✓ Bij slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag
- ✓ Bij ernstig of aanhoudend braken of diarree



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.



014 40 60 11: algemeen telefoonnummer AZ Turnhout
 014 40 60 81: klinisch apotheker
 014 40 69 02: polikliniek oncologie

Versiedatum: 04/07/2025