



Flowchart EFO-ablatie

Dag -1 pre-op

- Opladen pre-op EMV-plan (door cardioloog/ assistenten cardiologie)
- Aanvraag Cyberlab opmaken indien patiënt Marcoumar neemt

Dag 0 pre-op

- Pt wordt NUCHTER opgenomen
- ECG-controle (via polikliniek cardiologie)
- Indien PT vitamine K antagonist neemt (Vb. Marcoumar, marevan, sintrom) > **bloedname uitvoeren**
Andere bloedverduunners moeten 48 u voor procedure gestopt worden
Aspirine en/of andere plaatjesremmers mogen verder
- Klassiek pre-op dossier laten invullen (of online ook toegestaan)
Informed consent preoperatief dossier laten ondertekenen (ook bij onlineversie)
- Anamnese in te vullen
- Preoperatief scheren (volg scheerschema)
 - Thorax-beide liezen-pubis
 - Bij magere ptn: zo nodig rug scheren
- Wassen met Hibiscrub (isobetadine uniwash) en *vnl beide liezen* (douche zo mogelijk)
- Opladen pre-op EFO of ablatie plan. Gebruik hierbij pre-op knop

Dag 0 post-op

- ECG-controle (via polikliniek cardiologie) minimaal 4 uur na procedure
- Telemetrie opstarten (Standaard bij een ablatie, verder *enkel op indicatie!*)
- 4 uren bedrust
- Controle punctieplaats/ verband
- Opvolgen vitale parameters

Dag 1 post op

- Herstart bloedverduunners
- Cosafix verwijderen na doktersronde
Controle punctieplaats en verband
- Ontslag
- Ambulante controle na 6 weken (bij cardioloog of ritmeloog > interventiespecialist beslist)