

ABVD



Uw therapie bestaat uit het **celremmend middel: doxorubicine, bleomycine, vinblastine, dacarbazine**. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.

Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 2 dagen (D1-D15) waarop je intraveneus de 4 producten cytostatica toegediend krijgt.



Aandachtspunten

De toediening van doxorubicine kan roodverkleuring geven van urine en traanvocht. Dit tot enkele dagen na de toediening van doxorubicine. Daarom vermijd je best het dragen van contactlenzen.



Mogelijke interacties

- ✓ Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden
- ✓ Pompoelmoes, granaatappel of sterfruit vermijden
- ✓ Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts.



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans op infecties, bloedarmoede (VB: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang).
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Misselijkheid en braken
- ✓ Diarree of obstipatie
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Huid- en nagelveranderingen
- ✓ Allergische reactie zoals kortademig, jeuk, rillingen, beklemmend gevoel borst
- ✓ Koorts: 4 tot 10u na de toediening en kan 24u aanhouden.
- ✓ Tintelingen en voos gevoel in tenen en vingertoppen.
- ✓ Tijdelijke smaak- en geurverandering.
- ✓ Invloed op seksualiteit, vruchtbaarheid en menstruatie.



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

- ✓ Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met deksel naar beneden
- ✓ Sperma/vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen
- ✓ Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team

- ✓ Als je te **veel last** ondervindt van bovenvermelde **nevenwerkingen**
- ✓ Bij tekenen van **infectie**: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde **bloedingen**
- ✓ Dringende **vragen** over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: