

Zejula® (niraparib)



Zejula®, met als werkzame stof niraparib, wordt gebruikt voor de onderhoudsbehandeling van kanker van de **eierstokken**, de **eileiders** of het **buikvlies**, bij patiënten die gedeeltelijk of volledig reageerden op platinabevattende chemotherapie.



Zejula® remt een bepaald eiwit, namelijk het poly-adenosinedifosfaat-ribose-polymerase (PARP), in kankercellen. PARP is een belangrijk eiwit bij het herstellen van de erfelijke informatie van de cel (DNA). Door PARP te blokkeren zullen **kankercellen afsterven**.



Zejula® bestaat in capsules van 100 mg. De aanbevolen **dosis** is **afhankelijk** van het **gewicht** en **het aantal bloedplaatjes (200 mg of 300 mg éénmaal per dag)**. Als de nevenwerkingen te zwaar doorwegen kan de arts in overleg met jou de dosis verminderen of kan de behandeling tijdelijk onderbroken worden.



Neem **éénmaal per dag op een vast tijdstip (bij voorkeur s' avonds)** de aanbevolen dosis, met een half glas water.

Dagelijkse dosis: capsules Zejula® 100 mg



Neem de capsules in met of zonder voedsel. Slik de capsules **in hun geheel** door met een **half glas water**. Je mag de capsules **niet openen, niet fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je een **dosis** bent **vergeten**, neem dan de volgende dosis in volgens het gebruikelijke schema. Neem **geen dubbele dosis** om de vergeten capsule(s) in te halen.



Als je tijdens je behandeling met Zejula® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Zejula® kan de samenstelling van het bloed verstoren en andere klachten veroorzaken. Daarom zal de arts regelmatig gedurende de eerste maand wekelijks en erna maandelijks een bloedafname plannen om o.a. het aantal bloedcellen te controleren. Zejula® kan ook zorgen voor een verhoogde bloeddruk. Deze zal gedurende de eerste 2 maanden wekelijks en erna maandelijks gecontroleerd worden.



- Als je je duizelig, zwak of vermoeid voelt door de behandeling met Zejula®, wees dan **bijzonder voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt** of een **machine gebruikt**.
- Neem steeds contact op met je arts wanneer je een **vaccinatie** overweegt.
- Tijdens de behandeling met Zejula® mag je **NIET zwanger zijn of worden**. Zejula® kan namelijk schadelijke effecten hebben op het ongeboren kind. Effectieve **anticonceptie** moet gebruikt worden tijdens de behandeling en tot **4 weken na** de laatste **toegediende dosis** Zejula®.



Zoals elk geneesmiddel kan ook Zejula® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patienten):

- | | |
|--|---|
| ✓ Te weinig rode bloedcellen (anemie) met als gevolg vermoeidheid en algemene lichamszwakte (asthenie) | ✓ Smaakveranderingen, verlies van eetlust |
| ✓ Te weinig bloedplaatjes (bloedingen, blauwe plekken) | ✓ Misselijkheid, constipatie, braken en bovenbuikpijn |
| ✓ Te weinig witte bloedcellen (koorts, rillingen) | ✓ Diarree |
| ✓ Hoofdpijn | ✓ Urineweginfecties |
| ✓ Duizeligheid | ✓ Slapeloosheid |
| ✓ Hoest, kortademigheid, loopneus | ✓ Hartkloppingen, hoge bloeddruk |
| ✓ verstopte neus | ✓ Fotosensitiviteit, rash |
| | ✓ Rugpijn (artralgie) |



Contacteer het behandelend team :

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel van Zejula® hebt ingenomen
- ✓ Als je koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) hebt of tekenen van een infectie
- ✓ Als je last krijgt van hoofdpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, verwardheid of een gevoel van flauwte, met of zonder hoge bloeddruk
- ✓ Als je blauwe plekken of bloedingen hebt die langer duren dan normaal
- ✓ Bij ernstige of aanhoudende diarree
- ✓ Als je kortademig bent, je zeer moe voelt, een bleke huid of een snelle hartslag hebt
- ✓ Als volgende symptomen voor het eerst optreden of verergeren: kortademigheid, hoesten of een piepende ademhaling
- ✓ Als je een allergische reactie hebt, te herkennen aan: slik- of ademhalingsproblemen, duizeligheid, zwelling van lippen, tong, gezicht of bij ernstige jeuk van de huid gepaard met rode huiduitslag



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

