

Endoxan® (Cyclofosfamide)



Uw therapie bestaat uit het celremmend geneesmiddel: Cyclofosfamide. Deze therapie kan gebruikt worden in combinatie met andere chemotherapie. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Deze dienen ter ondersteuning van de behandeling om bijvoorbeeld bijwerkingen te beperken.



U zal deze chemotherapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen. **Cyclofosfamide** kan wekelijks of driewekelijks worden toegediend.

- ✓ **Wekelijks:** één cyclus duurt zeven dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Infuus over 1 uur.
- ✓ **Driewekelijks:** één cyclus duurt 21 dagen en omvat één ambulante opname voor chemotherapie. Dag één is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. Infuus over 3 uur.



Mogelijke interacties

Alcohol: gedurende 1 dag voor en 2 dagen na de therapie alcohol vermijden

Pompelmoes, granaatappel of sterfruit

Bepaalde homeopathische middelen of voedingssupplementen. Meld dit telkens aan je arts



Mogelijke bijwerkingen

- ✓ Remming van de aanmaak van bloedcellen: hierdoor verhoogde kans voor infecties, bloedarmoede(VB: sneller blauwe plekken, bloedneus, bloed in urine of stoelgang.
- ✓ Maag-darm klachten: verminderde eetlust, misselijkheid en braken of diarree
- ✓ Huidveranderingen
- ✓ Mondslijmvliesontstekingen
- ✓ Verlies van alle lichaamsharen
- ✓ Vermoeidheid
- ✓ Blaasontstekingen
- ✓ Tijdelijke smaak en geurverandering
- ✓ Vochttopstapeling



Extra info omgaan met uitscheiding

Uw uitscheiding (urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, en braaksel) kan sporen van chemotherapie bevatten.

Enkele tips:

Urine: zittend plassen, toilet tweemaal doortrekken met bril naar beneden

Sperma/vaginaal vocht: gebruik van condoom bij betrekkingen

Braaksel: zelf opruimen of naasten laten opruimen met handschoenen



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je te veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen,
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts boven 38°C, koude rillingen, spierpijn, hoesten...
- ✓ Bij ongecontroleerde bloedingen
- ✓ Dringende vragen over uw therapie



Noteer hier uw vragen of specifieke bijwerkingen die u wil bespreken tijdens de volgende consultatie: