



Patiënteninformatie

# Abatacept intraveneus

*Voorgeschreven door de reumatoloog*



# Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding .....	4
Werking van abatacept .....	4
Wanneer wordt abatacept voorgeschreven? .....	4
Vorbereiding.....	5
Het gebruik van abatacept .....	5
Controle .....	6
Bijwerkingen van abatacept .....	6
Zwangerschap en borstvoeding .....	7
Vaccinaties.....	7
Alcohol .....	7
Autorijden.....	8
Reisadvies .....	8
Zonlicht .....	8
Operaties .....	8
Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen.....	9
Abatacept en diabetes .....	9
Tot slot.....	10
Infuusschema.....	11

## Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u abatacept gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn. U hebt nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Het is belangrijk dat u deze brochure voor de afspraak hebt doorgelezen. Als u nog vragen hebt, kunt u deze met de reumaverpleegkundige bespreken.

## Werking van abatacept

Abatacept is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug), ofwel “ziektebeloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma”.

Bloed bestaat onder andere uit witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. Ze spelen ook een rol bij het ontstaan van gewrichtsontstekingen en gewrichtsschade bij reumatoïde artritis. De witte bloedcellen bestaan uit verschillende soorten cellen, bijvoorbeeld T-lymfocyten.

Abatacept is een eiwit dat de activiteit van de T-lymfocyten onderdrukt. Hiermee wordt het ontstekingsproces tot rust gebracht.

Abatacept kan ervoor zorgen dat pijn en zwelling in uw gewrichten afneemt en uw gewrichten op lange termijn minder schade oplopen.

## Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?

Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Abatacept kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere reumamedicijnen tegen reumatoïde artritis onvoldoende helpen.

## Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling met abatacept moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is.

Dit betekent dat onder andere onderzocht wordt of u in het verleden een tuberculose infectie of hepatitis hebt gehad.

Een aantal dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen. Via dit bloedonderzoek kunnen vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opgespoord worden

Als u een afspraak voor het infuus hebt en u weet of vermoedt dat u een infectie hebt, bel dan ten laatste tussen 8 en 8.30 uur de dag van het infuus zelf naar de reumaverpleegkundige of de dagbehandeling. Meestal wordt het infuus dan even uitgesteld.

## Het gebruik van abatacept

U krijgt abatacept in het ziekenhuis op het dagziekenhuis via een infuus.

De dag van het infuus meldt u zich steeds tussen 8u en 8u30 telefonisch aan bij het dagziekenhuis (014/44.42.13)

U heeft voor de toediening van uw infuus steeds eerst een afspraak op de polikliniek reumatologie (volg route C11).

De reumaverpleegkundige geeft u de uitslag van de bloedtesten en stelt u een aantal vragen om te bepalen of het infuus veilig gegeven kan worden.

Indien het infuus kan doorgaan wordt het voorschrift met u meegegeven naar het dagziekenhuis (volg route E89).

Het infuus duurt ongeveer een half uur. De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.

De eerste 3 behandelingen worden om de 2 weken gegeven. Nadien zijn de infusen maandelijks.

Terwijl het infuus gegeven wordt, worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gecontroleerd.

Na een eerste en tweede infuus blijft u nog een half uur op de dagbehandeling. De kans op een allergische reactie is klein. Als u een allergische reactie krijgt op dit medicijn, is dat meestal bij de eerste infusen. Vanaf het derde infuus mag u gelijk na de toediening naar huis. Het infuus heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. U kunt uw dagelijkse werkzaamheden meteen hervatten.

Abatacept werkt langzaam in. Het kan weken of maanden duren voordat u het effect merkt. Als blijkt dat u goed op dit medicijn reageert, kunt u dit langere tijd blijven gebruiken. De reumatoloog bespreekt dit met u.

Abatacept wordt meestal in combinatie met methotrexaat gebruikt.

## Controle

Tijdens de behandeling met abatacept wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Bij deze controle worden rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie gecontroleerd.

De eerste 3 tot 6 maanden van de behandeling wordt u regelmatig gecontroleerd om te kijken of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt bij u.

## Bijwerkingen van abatacept

Als er een ongewenste reactie of bijwerking optreedt, gebeurt dit meestal tijdens het inlopen van het infuus.

Soms treedt een allergische reactie of bijwerking later op. U kunt dan last hebben van: hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden en bloeddrukverhoging of -verlaging.

Als u last krijgt van een reactie of bijwerking tijdens het infuus, dan kan de toedieningssnelheid worden verlaagd of wordt het infuus gestopt. Zo nodig krijgt u een medicijn tegen de allergische reactie.

Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests en afwijkingen in het bloedbeeld.

Patiënten die met abatacept behandeld worden, zijn vatbaarder voor infecties. Neem daarom de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie (bv. ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje) contact op met uw huisarts of reumatoloog.

## Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de gevolgen van het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met uw reumatoloog.

## Vaccinaties

Niet zomaar elk vaccin mag toegediend worden aan patiënten die behandeld worden met abatacept.

De jaarlijkse griepvaccinatie (grieprik) en het pneumococcon vaccin worden aanbevolen.

We adviseren u om overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te bespreken

## Alcohol

Er is geen bezwaar als u (matig) alcohol gebruikt tijdens behandeling met abatacept.

## **Authorijden**

Abatacept zelf veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid. Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van abatacept.

Echter als je allergisch reageert tijdens de toediening van abatacept in de vorm van een infuus, krijgt u soms medicijnen tegen de allergische reactie. Deze kunnen uw rijvaardigheid wel beïnvloeden.

Overleg dan met je behandelaar of u veilig kunt rijden.

## **Reisadvies**

Wij raden u af om bij gebruik van abatacept naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

## **Zonlicht**

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van abatacept. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende, liefst katoenen, kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Maak liever geen gebruik van de zonnebank.

## **Operaties**

In theorie is er een verhoogd risico op infecties na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u abatacept gebruikt.

Als u een geplande operatie moet ondergaan, adviseren wij u om twee maanden voor deze operatie geen abatacept meer te gebruiken. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer abatacept gaan gebruiken. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met de reumatoloog of u preventief een antibioticakuur moet krijgen.



## Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen

Vertel uw huisarts over uw behandeling met abatacept.

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vertel bij uw apotheek ook altijd dat u abatacept gebruikt.

## Abatacept en diabetes

Sommige meetsystemen voor bloedsuikers kunnen op de dag van het abatacept-infuus een verkeerde uitslag geven door de maltose (een soort suiker) die in abatacept zit.

Dit is bij meters die zijn gebaseerd op glucose dehydrogenase pyroloquinone (GDH-PQQ). U kunt dit nakijken op de verpakking of in de handleiding van uw meetstelsel.

Als u afwijkende bloedsuikers heeft, overleg dan met de arts die u insuline voorschrijft of u de dosering moet aanpassen.

## Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen met de reumaverpleegkundigen: tel. 014 44 43 72 - **tussen 11.15 en 12.00 uur en tussen 15.30 en 16.30 uur.**

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u ook de arts bereiken op haar telefonisch spreekuur: tel. 014 44 43 72 - **tussen 7.30 en 8 uur.**

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- [www.bcfi.be](http://www.bcfi.be)
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

# Infuusschema

De voorgeschreven dosis is afhankelijk van gewicht:

<60 kg: 500mg

>60 kg en < 100 kg: 750 mg

> 100 kg: 1000 mg

Opstartfase: infuus op week 0, week 2, week 4

Onderhoudsbehandeling: infuus om de 4 weken

## AZ Turnhout vzw

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)

[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](http://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11