



Patiënteninformatie

Abatacept intraveneus

Voorgeschreven door de reumatoloog

Inhoud

Inhoud	3
Inleiding.....	5
Werking van abatacept	5
Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?	5
Vorbereiding.....	6
Het gebruik van abatacept	6
Controle	7
Bijwerkingen van Abatacept.....	7
Zwangerschap en borstvoeding	7
Vaccinaties.....	8
Alcohol	8
Autorijden.....	8
Reisadvies	8
Zonlicht	8
Operaties	9
Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen.....	9
Abatacept en diabetes	9
Infuusschema.....	10
Tot slot	10

Inleiding

De reumatoloog heeft met u besproken dat u abatacept gaat gebruiken. In deze brochure leest u meer over de behandeling met dit medicijn.

U heeft nog een afspraak bij de reumaverpleegkundige. Lees deze brochure voor die afspraak. Als u nog vragen heeft, kunt u deze bespreken met de reumaverpleegkundige.

Werking van abatacept

Abatacept is een reumabestrijdend middel en behoort tot de zogenaamde bDMARD (biological Disease Modifying Antirheumatic Drug). Het is een geneesmiddel die het ziektebeloop van reuma beïnvloedt.

Bloed bestaat onder andere uit witte bloedcellen. Deze zijn een onderdeel van het afweersysteem van het lichaam. Ze kunnen een rol spelen bij het ontstaan van ontstekingen van de gewrichten en schade aan de gewrichten veroorzaken. De witte bloedcellen bestaan uit verschillende soorten cellen, bijvoorbeeld T-lymfocyten.

Abatacept is een eiwit dat de activiteit van de T-lymfocyten onderdrukt. Hiermee remt abatacept het ontstekingsproces.

Abatacept helpt u bij:

- pijn, stijfheid en zwelling in uw gewrichten
- vermoeidheid
- vertraagt schade aan het bot en kraakbeen in de gewrichten

Wanneer wordt abatacept voorgeschreven?

Abatacept helpt bij de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis als een eerdere behandeling niet goed genoeg werkte of niet verdragen werd.

Abatacept kan u alleen of samen met bepaalde andere geneesmiddelen gebruiken, zoals methotrexaat.

Vorbereiding

Voor de behandeling met abatacept onderzoeken we of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling veilig is voor u. Dit houdt onder andere in dat we onderzoeken of u een TBC-infectie of hepatitis hebt of hebt gehad.

Een aantal dagen voordat u het infuus krijgt, laat u bloed afnemen. Via dit bloedonderzoek kunnen vroegtijdig infecties en mogelijke bijwerkingen van het infuus opgespoord worden.

Het gebruik van abatacept

- U krijgt abatacept in het ziekenhuis op het dagziekenhuis via een infuus.
- De dag voor het infuus meldt u zich steeds tussen 13u en 16u telefonisch aan bij het dagziekenhuis (014/44 42 13).
- U heeft de dag van uw infuus steeds eerst een afspraak op de polikliniek reumatologie.
- De reumaverpleegkundige geeft u de uitslag van de bloedtesten en stelt u een aantal vragen om te bepalen of het infuus veilig gegeven kan worden.
- Indien het infuus kan doorgaan, wordt het voorschrift met u meegegeven naar het dagziekenhuis (volg route E89).
- Het infuus duurt ongeveer een half uur. De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht.
- De eerste 3 behandelingen worden om de 2 weken gegeven. Nadien zijn de infusen maandelijks.
- Terwijl het infuus gegeven wordt, worden uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gecontroleerd.
- Na een eerste en tweede infuus blijft u nog een half uur op de dagbehandeling. De kans op een allergische reactie is klein. Vanaf het derde infuus mag u gelijk na de toediening naar huis.

Na enkele weken heeft u effect van abatacept. Abatacept wordt vaak samen met methotrexaat gebruikt.

Controle

Tijdens de behandeling met abatacept nemen we regelmatig bloed bij u. Zo kunnen we uw rode bloedcellen, witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes, leverfuncties en nierfunctie controleren.

We kijken dan telkens na of u het medicijn goed verdraagt en of het voldoende werkt.

Bijwerkingen van Abatacept

Sommige patiënten die abatacept nemen, krijgen last van deze bijwerkingen:

- Patiënten die abatacept gebruiken, zijn vatbaarder voor **infecties**.
 - Meet daarom uw temperatuur wanneer u zich ziek voelt.
 - Contacteer uw huisarts of reumatoloog als u koorts heeft of bij andere tekenen van infectie (bijvoorbeeld ter hoogte van de luchtwegen, een pussend wondje, ...).
- Bijwerkingen van **organen**: dit zijn bijwerkingen die u zelf niet merkt. Uw arts kijkt dit na via bloedonderzoek. Het gaat om afwijkingen in het bloedbeeld, levertesten, nierfunctie.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over de invloed van abatacept op vruchtbaarheid en zwangerschap.

- Heeft u een kinderwens? Bespreek dit met uw reumatoloog.
- U mag abatacept niet gebruiken als u zwanger bent.
- U mag abatacept niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk.

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven, overleg dan eerst met de reumatoloog.

Vaccinaties

Patiënten die abatacept gebruiken, mogen niet zomaar elk vaccin krijgen.

- We raden aan om u te laten vaccineren tegen pneumokokken en jaarlijks tegen griep.
- Andere vaccinaties moet u bespreken met uw huisarts of reumatoloog.

Alcohol

U mag (matig) alcohol drinken tijdens de behandeling met abatacept.

Autorijden

U mag autorijden als u abatacept gebruikt. Abatacept veroorzaakt geen sufheid of slaperigheid.

Reisadvies

Wij raden u af om bij gebruik van abatacept naar landen te reizen zonder goede medische en hygiënische voorzieningen. Wilt u toch naar dit soort landen reizen, bespreek dit dan eerst met uw reumatoloog.

Zonlicht

Bescherm u goed tegen blootstelling aan zonlicht en UV –straling tijdens het gebruik van Abatacept. Uw huid is gevoeliger voor de zon.

Draag beschermende kleding en gebruik bij blootstelling van de huid aan de zon een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Operaties

Heeft u een operatie gepland? Bespreek dit vooraf met uw reumatoloog.

- Er kan een verhoogd risico op infecties zijn na een operatie en een vertraagde wondgenezing als u abatacept gebruikt.
- Bij een geplande operatie, stopt u het best 1 maand voor deze operatie met abatacept. Zodra de operatiewond genezen is, mag u weer abatacept gebruiken.
- Bij bloedige tandheelkundige behandelingen overlegt u met een arts of u vooraf een antibioticakuur moet krijgen.

Gebruik van abatacept samen met andere medicijnen

Vertel u huisarts en apotheek over uw behandeling met abatacept.

Het is niet altijd veilig om verschillende medicijnen te combineren. Vertel uw huisarts, tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u al gebruikt. Denk hierbij ook aan het eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Abatacept en diabetes

Sommige meetsystemen voor bloedsuikers kunnen op de dag van het infuus een verkeerde uitslag geven. Dit is zo bij meters die zijn gebaseerd op glucose dehydrogenase pyroloquinone (GDH-PQQ). U kunt dit nakijken op de verpakking of in de handleiding van uw meetsysteem.

Infuusschema

De voorgeschreven dosis is afhankelijk van uw gewicht:

- <60 kg: 500mg
- >60 kg en < 100 kg: 750 mg
- >100 kg: 1000 mg

Opstartfase: infuus op week 0, week 2, week 4 daarna om de 4 weken

Onderhoudsbehandeling: infuus om de 4 weken

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kan u op maandag tot en met donderdag bellen met de polikliniek van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u30 op het nummer 014/44 43 72.

Als u een afspraak voor het infuus heeft, vragen we u ALTIJD 1 dag voor uw infuus te bellen naar het dagziekenhuis tussen 13u00 en 16u00 op het telefoonnummer 014/44 42 13 om te bevestigen of u komt of niet.

Meer informatie over medicatie kunt u terugvinden op volgende websites:

- www.bcfi.be
- <http://bijsluiters.fagg-afmps.be/>

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11