




Patiënteninformatie

Behandeling met corticoïden



Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	3
Werking van corticoïden	3
Toedieningswijze	4
Mogelijke bijwerkingen.....	5
Zwangerschap	5
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities/ vragen	6

AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling met CORTICOIDEN. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of IBD-verpleegkundige.

Werking van corticoïden

Corticoïden zijn zeer doeltreffend bij de behandeling van opstoten van Crohn en Colitis Ulcerosa maar kunnen niet gebruikt worden als onderhoudsbehandeling.

Corticoïden zijn bijnierschors hormonen die ontstekingsremmend werken. Ze hebben effect op uw afweer en ontstekingen, maar ook op de werking van organen zoals uw hart, vetstofwisseling, de hoeveelheid zouten en suikers in het bloed en uw bloeddruk.

We onderscheiden 2 groepen.

De **lokaal werkende corticoïden** werken lokaal in de darm om daar de ontsteking te verminderen. Ze komen slechts in beperkte mate in de bloedcirculatie terecht en veroorzaken daardoor minder bijwerkingen.

De **corticoïden met systemische werking** zijn krachtiger en hebben effect op het ganse lichaam, maar veroorzaken hierdoor ook meer bijwerkingen.

Toedieningswijze

Lokaal werkende corticoïden

BUDESONIDE (bv. Budenofalk®, Entocort®)

Deze kunnen worden voorgeschreven om via de mond te nemen (capsules van 3 mg), maar ook in vorm van een zetpil, lavement of schuim.

BECLOMETASON (bv. Clipper®)

Deze worden voorgeschreven om via de mond te nemen (capsules van 5 mg)

Corticoïden met systemische werking

METHYLPREDNISOLONE

Medrol®:

Deze worden voorgeschreven om via de mond te nemen (pilletjes van 32, 16 of 4mg)

Solumedrol®:

Deze worden intraveneus (via infusen) toegediend.

Er is ook *Prednisolone®* verkrijgbaar in de vorm van lavementen en zetpillen.

Corticoïden neemt u best 's morgens in. Bij ernstige opstoten kan het zijn dat uw arts beslist om een dubbele dosis te starten bij het begin van de behandeling. Om botontkaling te voorkomen, wordt de behandeling met corticoïden vaak aangevuld met calcium en vitaminen D preparaten.

Belangrijk is de behandeling met corticoïden steeds langzaam af te bouwen. Als u de behandeling plots onderbreekt, kunnen gevaarlijke ontwenningssverschijnselen optreden of kan u een nieuwe opstoot uitlokken.

Mogelijke bijwerkingen

Lokaal werkende corticoïden

Omdat dit geneesmiddel nauwelijks in de bloedbaan terecht komt, zijn de nevenwerkingen hier minder. Wat kan voorkomen:

- opzwellen van het gezicht
- stemmingswisselingen
- prikkelbaarheid
- acne
- stoornissen van het gezichtsvermogen
- botontkalking

Corticoïden met systemische werking

Bijwerkingen van corticoïden komen relatief vaak voor, vooral bij langdurige behandelingen in hogere doseringen. De voornaamste zijn:

- veranderingen aan het uiterlijk zoals opzwellen van het gelaat en acne
- de huid kan zeer broos worden en blauwe vlekken vertonen
- slechte wondheling
- botontkalking
- afwijkingen aan de ogen zoals cataract en glaucoom
- slapeloosheid, zenuwachtigheid of prikkelbaarheid, verhoogde eetlust
- hoge bloeddruk
- verhoogde kans op infecties

De meeste bijwerkingen verdwijnen langzaam na het stopzetten van de behandeling.

Zwangerschap

Corticoïden hebben geen invloed op de zwangerschap of borstvoeding.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de IBD-verpleegkundigen.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

campus Sint-Jozef
Steenweg op Polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten
Merksplas 44, 2300 Turnhout
2^{de} verdieping, route D50
Afspraken – secretariaat 014/44 44 40



IBD-verpleegkundigen ibd@azturnhout.be 014/44 44 37
Wendy Janssens en Bie Pattyn

De gastro-enterologen:
Dr. Claessens, Dr. Croonen, Dr. Harlet, Dr. Van Roey, Dr. Van Gool,
Dr. T'Syen, Dr. Mortier

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout