

Revolade® (eltrombopag)



Revolade®, met eltrombopag als werkzame stof, wordt gebruikt bij **primaire immungemedieerde trombocytopenie (ITP)**, bij verworven **aplastische anemie** en bij volwassenen met **chronische hepatitis C** die **thrombocytopenie** ontwikkelen en waarvoor behandeling vereist is.



Revolade® werkt in op het transmembrane gebied van de **trombopoëetine(TPO)-receptor**. Door binding aan de TPO-receptor wordt de vermenigvuldiging en groei van de voorlopercellen gestimuleerd, wat zorgt voor een toename van de **bloedplaatjes productie**.



De tabletten bestaan in doses van **25 mg** en **50 mg**. De aanbevolen **dagelijkse dosis** hangt af van de indicatie en de bloedplaatjes.



Neem **éénmaal per dag** op een vast tijdstip de aanbevolen hoeveelheid in met een half glas water.

Dagelijkse dosis: ... mg = ... tabletten Revolade® ... mg



Neem Revolade® **ALTIJD** ten minste 2 uur vóór of 4 uur na geneesmiddelen, producten of voedingsmiddelen met een substantiële hoeveelheid van polyvalente kationen zoals antacida, melkproducten of sommige minerale voedingssupplementen. **Voedsel** met weinig calcium (< 50 mg), zoals fruit, magere ham, rundvlees, onverrijkt vruchtensap, sojamelk of granen kan tegelijkertijd met eltrombopag ingenomen worden.

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Je mag de tabletten **niet breken, fijnmalen** of erop **kauwen**.



Als je tijdens je behandeling met Revolade® nog **andere medicatie, kruiden, homeopathische middelen of voedingssupplementen** inneemt of overweegt in te nemen, meld dit dan aan je arts of apotheker.



Als je een **dosis** Revolade® bent **vergeten**, dan kan je op dezelfde dag de vergeten dosis alsnog **zo snel mogelijk innemen**. Ga daarna op de volgende dag verder met je gebruikelijke schema. **Neem geen dubbele dosis** om de vergeten dosis in te halen en neem geen twee dosissen op één dag.



Revolade® kan de leverfunctie verstoren. Daarom zal je arts regelmatig een bloedafname plannen om o.a. de leverfunctie te controleren. De arts zal ook de bloedplaatjes opvolgen.



Als je je duizelig of vermoeid voelt door de behandeling met Revolade®, wees dan bijzonder **voorzichtig** wanneer je een **voertuig bestuurt of een machine gebruikt**.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Revolade® nevenwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende **nevenwerkingen** komen **zeer vaak** voor (bij meer dan 1/10 patiënten) afhankelijk van de indicatie:

ITP

- ✓ Nasofaryngitis, bovenste luchtweginfectie (bij kinderen). Diarree, misselijkheid. Hoest (bij kinderen). Rugpijn. Verhoogde waarden van ALAT.

Aplastische anemie

- ✓ Hoofdpijn, duizeligheid. Hoesten, loopneus, orofaryngeale pijn. Misselijkheid, diarree, buikpijn, bloedend tandvlees. Gewrichtspijn, pijn in extremiteit, spierspasmen. Vermoeidheid, koorts. Verhoogde transaminasewaarden.

Chronische HCV-infectie met trombocytopenie

- ✓ Anemie. Verminderde eetlust. Hoofdpijn. Hoesten. Misselijkheid, diarree. Jeuk. Spierpijn. Koorts, vermoeidheid, influenza-achtige ziekte, asthenie, perifeer oedeem.



Contacteer het behandelend team:

- ✓ Als je veel last ondervindt van bovenvermelde nevenwerkingen
- ✓ Als je te veel Revolade® hebt ingenomen
- ✓ Bij tekenen van infectie: koorts ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), koude rillingen, hoesten, ademhalingsproblemen of een piepende ademhaling, ...



Noteer hier je vragen of specifieke bijwerkingen die je wil bespreken tijdens de volgende consultatie.

