



Patiënteninformatie

# Vaccin tegen HPV voor meisjes én jongens

*AZ Turnhout heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt de raadpleging bij je zorgverlener niet. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Turnhout, personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.*

## Inhoud

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Humaan Papillomavirus zowel bij meisjes als jongens ..... | 4 |
| Besmetting met HPV .....                                  | 4 |
| Screening op baarmoederhalskanker .....                   | 4 |
| Vaccinatie voor meisjes en jongens .....                  | 5 |
| Waarom jongens of mannen vaccineren? .....                | 5 |
| Tot slot .....                                            | 6 |

# Humaan Papillomavirus zowel bij meisjes als jongens

Elk jaar worden in België meer dan 1000 nieuwe HPV (Humaan papilloma virus) gerelateerde kankers vast gesteld en dit zowel bij vrouwen als bij mannen.

HPV veroorzaakt niet alleen kanker van de baarmoederhals maar kan bij de vrouw ook kanker aan schaamlippen en vagina veroorzaken. Bij mannen kan dit aanleiding geven tot kanker van de penis en bij beide geslachten tot kanker van hoofd, hals en anus.

Daarnaast is dit virus ook verantwoordelijk voor het optreden van anogenitale wratten (condylomen) die jaarlijkse ongeveer 18000 mannen en vrouwen treft.

## Besmetting met HPV

Het humaan papillomavirus (HPV) is een veel voorkomende virale infectie bij seksueel actieve mensen. HPV is besmettelijk en wordt overgedragen via seksueel contact. Iedereen heeft 80% kans om in zijn of haar leven een HPV besmetting op te lopen.

In de meeste gevallen vormt een besmetting geen probleem en verdwijnt een HPV-infectie vanzelf. Wanneer ons afweersysteem de infectie niet kan genezen, zal het virus zich langzaam aan in bepaalde cellen vestigen. Een dergelijke chronische infectie kan leiden tot veranderingen in de cellen en over verloop van meestal jaren aanleiding geven tot kanker.

## Screening op baarmoederhalskanker

Indien vrouwen zich laten screenen voor baarmoederhals kanker kunnen deze celveranderingen op tijd worden opgespoord en indien nodig behandeld worden zodat er geen kanker kan ontwikkelen. Dit gebeurt via een uitstrijkje van de baarmoederhals om de 3 jaar. Hierbij wordt met een borsteltje oppervlakkige cellen verwijderd zodat deze kunnen onderzocht worden. In de nabije toekomst kan dit eventueel via een rechtstreekse HPV testing waarbij wordt nagekeken wie drager is van hoog risico HPV. Deze patiënten volgen we van dichtbij op.

## Vaccinatie voor meisjes en jongens

Sinds enkele jaren biedt de overheid de mogelijkheid aan alle jongeren op de leeftijd van 12 jaar om zich te laten vaccineren tegen HPV via het CLB. Voor meisjes werd de vaccinatie reeds langer terugbetaald door de mutualiteiten. Sinds augustus 2022 kunnen nu ook alle jongens tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar zich gratis laten vaccineren via hun huisarts of pediater.

Een volledige vaccinatie bestaat uit 2 vaccins binnen het zelfde jaar. Vanaf de leeftijd van 15 jaar wordt een vaccinatieschema met 3 doses aangeraden.

Het vaccin Gardasil®9 biedt bescherming tegen 9 types van HPV die meestal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van kanker of condylomen. Het beschermt echter niet tegen alle types. Daarom is het voor vrouwen nog steeds belangrijk zich te laten screenen voor baarmoederhalskanker. U kan hiervoor uw huisarts of gynaecoloog contacteren.

### Waarom jongens of mannen vaccineren?

- HPV gerelateerde kankers komen ook bij mannen voor
- Jongens en mannen hebben evenveel recht op bescherming. Gender onafhankelijke en gelijke toegang tot immunisatie. Gezondheid en preventieve geneeskunde is een recht voor iedereen.
- In tegenstelling tot baarmoederhalskanker bestaat er voor de andere kankers geen mogelijkheid tot screening. De diagnose wordt dus meestal pas gesteld als er klachten aanwezig zijn. Vaccinatie is dus de enige preventieve maatregel die mogelijk is.
- Door het totaal aantal gevaccineerden te verhogen zou de circulatie en dus ook de overdracht van het HPV virus kunnen verminderen en ontstaat er een groepsimmunitet waar iedereen de voordelen van heeft.

## Tot slot

Vraag raad aan je huisarts, gynaecoloog of pediater.

Dienst Gynaecologie AZ Turnhout (Gynesis)  
Campus Sint-Jozef  
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout  
Route C20  
014 44 44 20

Dienst kindergeneeskunde  
Campus Sint-Jozef  
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout  
Route C35  
014 44 44 16



## **AZ Turnhout vzw**

[www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)  
[info@azturnhout.be](mailto:info@azturnhout.be)  
014 40 60 11



Blijf op de hoogte via [www.facebook.com/azturnhout](https://www.facebook.com/azturnhout)



### **Campus Sint-Jozef**

Steenweg op Merksplas 44  
2300 Turnhout



### **Campus Sint-Elisabeth**

Rubensstraat 166  
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout