Patiënteninformatie

Diphencyprone

az turnhout

Inhoud

Inleiding 4
Omschrijving en doel van de behandeling 4
Wat is diphencyprone? 4
Verloop van de behandeling 4
Hoe wordt diphencyprone gebruikt? 4
Voor wie is diphencyprone geschikt? 5
Duur van de behandeling 5
Eventuele bijwerkingen 5
Gebruik diphencyprone tijdens zwangerschap of borstvoeding 6
Wanneer wordt diphencyprone gebruikt? 6
Tot slot 6
Wie contacteren bij vragen of problemen? 6
Persoonlijke notities/ vragen 7

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een behandeling met diphencyprone. U leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving en doel van de behandeling

Wat is diphencyprone?

Diphencyprone is een laboratoriumstof, die heel sterk verdund wordt met aceton, waardoor een kleurloze vloeistof ontstaat. Als diphencyprone op de huid komt, veroorzaakt dit binnen korte tijd een huiduitslag (eczeem) op die plek. Soms helpt eczeem bij het verdwijnen van huidziekten. Diphencyprone wordt vooral gebruikt tegen een bepaalde vorm van haarverlies: alopecia areata. Het wordt soms ook gebruikt bij de behandeling van wratten die op geen enkele andere manier verdwijnen.

Verloop van de behandeling

Hoe wordt diphencyprone gebruikt?

Eerst wordt er om de week op de polikliniek dermatologie een druppel diphencyprone op de huid aangebracht. Dit gebeurt net zo vaak tot er eczeem is ontstaan. Het is per persoon verschillend of dit snel gebeurt of lang duurt, maar gewoonlijk is dit na één tot drie weken. Wanneer er eczeem (allergische reactie) is ontstaan, wordt de huid waarop de druppel werd aangebracht rood, gaat jeuken en zwelt soms op. Heel soms ontstaan er blaren.

Zodra er eczeem is ontstaan (en u dus allergisch bent geworden voor de stof diphencyprone), starten we met het behandelen van de huidaandoening zoals alopecia areata of wratten. De plek van de huidaandoening wordt vervolgens op de polikliniek dermatologie wekelijks aangestipt met een (of meerdere) zeer sterk verdunde

oplossing(en) met diphencyprone. De dosis van de diphencyprone in de oplossing wordt wekelijks langzaam opgebouwd tot er een sterkte gevonden wordt waarbij wat jeuk of een klein beetje eczeem op het behandelde huiddeel ontstaat.

Van zodra we deze voor u geschikte sterkte gevonden hebben, zal dit aan u worden voorgeschreven, waarna u thuis wekelijks de diphencyprone zelf op de kale plekjes of de wratten kan gaan aanstippen. Meestal wordt dan een controle gepland na een zestal weken.

Voor wie is diphencyprone geschikt?

Diphencyprone kan gebruikt worden bij omvangrijke alopecia areata, die op geen enkele andere manier weg gaat. Of bij alopecia areata die therapieresistent is en waarbij hormoonlotions geen effect hebben. Wanneer het haarverlies meer dan een jaar aanwezig is en de kans op herstel klein is, kan gekozen worden voor een behandeling met diphencyprone. Ook voor wratten die niet door andere behandeling verdwijnen en/of heel uitgebreid zijn, kan gekozen worden voor diphencyprone.

Duur van de behandeling

Een behandeling met diphencyprone kost veel tijd. Als de behandeling op de juiste manier gebeurt, dan duurt het vaak nog maanden voordat een resultaat zichtbaar wordt. Deze behandeling werkt niet bij iedereen. U moet er rekening mee houden dat deze behandeling bij tenminste 1 op de 5 mensen **niet** het gewenste resultaat heeft.

Eventuele bijwerkingen

Diphencyprone kan bijwerkingen geven. Bij het instellen van de therapie kan soms onverwacht een heftige reactie ontstaan. Dit uit zich in:

- Heftig eczeem, jeuk of galbulten op de plaats van de behandelde huid.
- Een enkele keer kan de allergische reactie zich over het hele lichaam verspreiden, waarbij over het hele lichaam eczeem, galbulten en jeuk kan ontstaan. Soms zwelt de huid op.

- In hele zeldzame gevallen zijn extreem sterke allergische reacties beschreven, zelfs met shock tot gevolg.

Gebruik diphencyprone tijdens zwangerschap of borstvoeding

Het is niet duidelijk in welke mate diphencyprone door het aanbrengen op de huid in het lichaam kan komen. Diphencyprone wordt daarom **niet** toegepast tijdens de zwangerschap of bij vrouwen die borstvoeding geven.

Wanneer wordt diphencyprone gebruikt?

Het instellen van een behandeling met diphencyprone duurt lang en kost veel tijd. Daarbij is er kans op bijwerkingen. Het wordt daarom alleen gebruikt wanneer andere behandelingsmogelijkheden geen of onvoldoende resultaten geven en wanneer de huidaandoening al heel lang aanwezig is zonder dat er zicht is op verbetering.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u samen met uw arts over uw behandeling. Heeft u na het gesprek met uw dermatoloog en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Dienst dermatologie
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
☏ 014 44 42 54

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen • gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44 • 2300 Turnhout